

XXIV. *Species of Erica.* By Richard Anthony Salisbury, Esq.

F.R.S. & L.S.

*Read October 6, 1801.*

ERICAS, in absolutâ monographiâ nunc illustrare, minime mihi propositum est. Attamen, quandoquidem in hoc genere nonnihil desudaverim, et multæ ejus pulcherrimæ species, sub ineptis ne dicam falsis hortulanorum titulis, iterum a Willdenow evulgantur, meos Characteres, et Nomina, demum profero.

Species ordinavi secundum earum affinitates, adeo ut inter se proxime collocentur simillimæ: cuivis diversæ methodo parum amicus. Etenim, si e numero foliorum separas, hunc non solum in unâ eademque stirpe mire ludentem offendes, sed tales divisiones magnitudine suâ laborantes fere nihil juvant: idem fortius objiciatur sectionibus ex antheris muticis calcaratisve petitis, quippe quæ valde propinquas species, imo ipsas varietates distrahunt: nec magis naturalem distributionem, vel e bracteis, vel ex inflorescentiâ, vel e filamentis, vel e fructu, adhuc extorquere potui. Jamdudum nos docuit Linnè, in Regno Vegetabili novæ prolis Herbam sequi patrem, Florem vero matrem: inde Clavis vastissimorum generum, ut mihi videtur, haud ita difficilis. Quamobrem cohortes e strûcturâ corollæ antherarumque potissimum desumpsi, gradumque affinitatis per comma, semi-colon, rariusve colon, pone singula nomina appositum, indicavi: ubi nullum vidi præter communem generis nexum, ista species periodo notatur: multas enim similitudines oculis conspicimus, quas tamen verbis exprimere admodum difficile sit. Nihilominus in Differentiis Specificis, puras certissimasque notas eligere conatus sum, haud magis

magis quod opus esset dicere, quam quod non opus esset, non dicere, sollicitus.

Mirum fortasse nonnullis videatur, Ericam *vulgarem* desiderari in sequentibus paginis: sciant autem velim, hancce stirpem, si quæ alia in toto Ordine, proprium constituere genus: jure antiquiore profecto suum nomen retinuisse, sed cum tot aliæ stirpes, apud omnes Botanicos jam eodem cognomine gaudeant, satius duxi hanc unam novo insignire titulum: itaque *Callunam* appellavi, ob usum ejus frequentissimum in scopis conficiendis: essentia generis, quâ differt ab *Ericâ*, est in pericarpii valvis ad latera loculorum dehiscentibus, septis axi relictis: habitus, absque ullo rudimento petioli pedunculive, omnino sessilis. Alterum genus, cum illo pariter confusum, ob stigma grande *Salaxis* mihi audit, cuius calyx irregularis, et pericarpium drupaceum, triloculare, trispernum: quatuor species innotuere, faciem *Ericæ scopariae* præ se ferentes.

Paucas observatiunculas, in editione Dissertationis *Ericæ a Thunberg*, quam nuper typis mandabam, inferui. Hallucinationes graviores in tam vasto genere pene inevitabiles, Synonyma infra tacite indicabunt: cæterum hæc non nisi ex speciminibus ipsis auctorum unquam citavi. Maximâ profecto beneficientiâ sua Herbaria mihi patefecerunt omnes, atque frustula vel rarissimorum exemplarium communicaverunt: adeo ut ducentas et quinquaginta legitimas species nunc possideam, quarum dimidiam circiter partem in vivis aloci. Hasce omnes, numerosissimis varietatibus mixtas dignoscere, et prout verum Botanicum decet exponere, haud labor erit paucorum annorum: nimis felix si qua haec tenus videar vestigiis institisse admirandi Linnæ, qui non absque divino quodam afflato, cum Vegetabilium differentias tradidit, longissimo intervallo omnes superavit.

*Synopsis Specierum, secundum earum Affinitates.*

<i>Scoparia.</i> 3. m. i. p: ax.	<i>Tenuis.</i> 3. c. i. t.
<i>Spiculifolia.</i> 3. m. i. ax.	<i>Humilis:</i> 3. c. i. t.
<i>Virgularis,</i> 3. m. i. t.	<i>Peduncularis:</i> 3. c. i. t.
<i>Asperifolia,</i> 3. m. c. i. t.	
<i>Ferox.</i> 3. m. i. t.	<i>Amœna.</i> 3. c. i. t.
<i>Oxycoccifolia,</i> 3. c. i. ax?	<i>Glomiflora,</i> 3. c. i. t.
<i>Thymifolia.</i> 3. c. ie. ax.	<i>Formosa.</i> 3. c. i. t.
<i>Axillaris.</i> 3:4. c. i. ax.	<i>Carduifolia.</i> . c. i. t.
<i>Sicæfolia.</i> 3. c. i. t.	<i>Tubercularis.</i> 3. m. i. t.
<i>Urceolaris,</i> 3. c. i. t.	<i>Campanularis.</i> 3. m. i. t.
<i>Fausta,</i> 3. c. i. t.	
<i>Pallida,</i> 3. c. i. t.	<i>Medioliflora.</i> 3. m. i. t.
<i>Tomentosa,</i> 3. c. i. t.	<i>Blanda,</i> 3. m. i. t.
<i>Auricularis,</i> 3. c. i. t.	<i>Hottoniæflora,</i> 5. c. i. ax.
<i>Lamellaris,</i> 3. c. i. t.	<i>Seriphiiifolia,</i> 5. m. i. ax.
<i>Marifolia,</i> 3. c. i. t.	<i>Lavandulæfolia,</i> 3. m. i. t.
<i>Helianthemifolia.</i> 2. c. i. t.	<i>Humifusa,</i> 3. m. i. t.
<i>Calathiflora.</i> 3. c. i. t.	<i>Cristæflora,</i> 3. m. i. t.
<i>Procera,</i> 3:5. c. i. t.	<i>Lysimachiæflora,</i> 3. m. i. t.
<i>Polytrichifolia.</i> 3:5. c. i. t.	<i>Passerinæfolia:</i> 3. m. i. t.
	<i>Byssina,</i>

- Byssina, 3. m. ic. t.  
 Velleriflora, 3. m. e. t.  
 Carbasina: 3. m. e. t.  
 Scariofa, 3. c. e. t.  
 Sexfaria, 3. c. e. t.  
 Corydalis, 3. c. i. t.  
 Azaleæfolia, 3. m. e. t.  
 Petiolaris, 3. m. i. t.  
 Vesicularis, 3. c. i. t.  
 Verniciflua, 3. c. i. t.  
 Lachneæfolia, 3. c. i. t.  
 Volutæflora, 3. c: m. i. t.  
 Lyrigera, 3. c. i. t.  
 Salax, 3. c. i. t.  
 Gnidiæfolia, 3. c. i. t.  
 Cumuliflora, 3. m. i. t.  
 Genistæfolia, 3. m. i. t.  
 Periplocæflora, 3. c. i. t.  
 Lucida, 3. c. i. t.  
 Munda, 3. c. i. t.  
 Gnaphaliiflora. 3. c. i. t.  
 Fabrilis, 3. c. i. t.  
 Dianthifolia, 2. c. i. t.  
 Brevifolia, 3. c. i. t.  
 Chlamydisflora, 3. c. i. t.  
 Selaginifolia. 3. c. i. t.  
 Pannosa. 3 : 5. c. i. t.  
 Hirfuta, 4. m. i. t.  
 Plumosa, 4. c. i. t.  
 Ciliciiflora. 3. m. i. t.  
 Xeranthemifolia, 3. m. e. t.  
 Nodiflora, 3. m. e. t.  
 Flosculosa, 4. m. c. t.  
 Exilis, 4. m. e. t.  
 Labialis, 3. m. e. t.  
 Embolifera, 4. c. e. t.  
 Dumofa, 4. c. e. t.  
 Barbigerá, 4. m. e. t.  
 Paleacea, 4. m. e. t.  
 Bruniæfolia, 6. c. e. t.  
 Turmalis, 6. m. e. t.  
 Equisetifolia. 3. m. e. t.  
 Diotæflora, 3. m. e. p:ax.  
 Sertiflora, 3. m. e. p:ax.  
 Flexilis. 4. m. e. ax.  
 Saxatilis, 3-5. m. c. p:ax.  
 Lugubris, 4. m. e. p:ax.  
 Multiflora, 5-6. m. c. p:ax.  
 Manipuliflora, 3. m. c. p:ax.  
 Vaga. 5-6. m. c. p:ax.  
 Lentiformis: 3. m. e. t.  
 Pudibunda. 3-4. m. e. t.  
 Filiformis, 3. c. e. t.  
 Turgida,

Turgida. 3. c. e. t.

Fusiformis ; 3 : 4. m. c. t.

Fragilis ; 3. m. e. t.

Vestiflua, 3. m. e. t.

Baculiflora, 3. m. e. t.

Cothurnalis, 3. m. e. t.

Socciflora, 3. m. e. t.

Furfurosa, 3. m. e. t.

Follicularis, 3. m. e. t.

Penicilliflora. 3. m. e. t.

Placentæflora, 3. m. e. t.

Pyramidalis, 3. m. e. t.

Squamæflora, 3. m. e. t.

Cæfia, 3. m. e. t.

Flexuosa, 3. m. e. t.

Lasciva, 3. m. e. t.

Stylofa, 3. m. e. t.

Spirææflora, 3. m. e. t.

Milleflora. 3. c. e. t.

Diosmæfolia, 3. c. i. t.

Palliflora, 3. c. i. t.

Fugax, 3. c. i. t.

Pyrolæflora, 3 : 4. c. i. t.

Tegulæfolia, 3. c. i. t.

Baccæformis. 4 : 3. c. i. t.

Modesta : 3. c. i. t.

Holoericea. 3. c. i. t.

Glaucha : 3. c. i. t.

Variifolia. 3. c. i. t.

Rupestris. 3. c. i. t.

Versicolor, 3. m. i. t.

Decora, 3. c. i. t.

Cupressiformis, 3. c. i. t.

Melliflua. 3. c. i. t.

Nana, 4. c. i. t.

Spissifolia, 6. c. i. t.

Sacciflora, 4. c. i. t.

Cylindriflora. 6. c. i. t.

Paludosæ, 6. m. i. t.

Lituiflora. 4. m. i. t.

Obpyramidalis, 4. m. i. t.

Cyrillæflora, 4. m. i. t.

Velitaris. 4. c. i. t.

Culcitæflora, 4. c. i. t.

Tubiflora, 4. c. i. t.

Curviflora, 4. c. i. t.

Cuspidigera, 4. c. i. t.

Bibax, 4. c. i. t.

Buccinæformis, 4. c. i. t.

Fastuosa,

- Fastuosa. 4. c. i. t.  
 Stagnalis, 4. m. i. t.  
 Conspicua, 4-5. m. i. t.  
 Longiflora, 6. m. i. t.  
 Verticillaris, 5-6. m. i. t.  
 Floccosa. 5-6. m. i. t.  
  
 Radiiflora, 8. c. i. p: lat.  
 Lycopodiifolia. 6. m. i. p: lat.  
  
 Pharetræformis, 6. m. i. p: ax.  
 Grandiflora, 6. m. e. p: ax.  
 Cerviciflora, 5-6. c. e. p: ax?  
 Pinifolia, 6. c. i. p: ax.  
 Calamiformis, 6. m. i. p: ax.  
 Longifolia, 6. m. c. i. p: ax.  
 Costæflora, 6. m. i. p: ax.  
 Onosmæflora, 6. m. i. p: ax.  
 Pulviniformis, 6. m. i. p: ax.  
 Frondosa, 6. m. i. p: ax.  
 Phylicæflora, 6. m. i. p: ax.  
 Argutifolia. 6. m. i. p: ax.  
  
 Favosa, 6. c. i. p: ax.  
 Sceptriformis, 8. c. i. p: ax.  
 Clavæflora, 6. c. i. p: ax.  
 Alveiflora, 6. c. i. p: ax.  
 Mammosa. 4. c. i. p: ax.  
  
 Brachialis. 4. m. i. t.  
 VOL. VI.
- Hystriciflora, 4. m? i. t.  
 Strigilifolia, 4. c. i. t.  
 Pectinifolia, 4. c. i. t.  
 Crinifolia. 6. c. i. t.  
  
 Cernua. 4. c. i. t.  
  
 Doliiformis. 6. c. i. t.  
  
 Pistillaris 4. c. i. t.  
  
 Ciliaris: 3. m. i. ax.  
  
 Botuliformis, 4. c. i. t.  
 Multicaulis. 6. c. i. t.  
  
 Mutabilis. 3. c. i. lat.  
  
 Uncifolia. 4. c. i. p: ax.  
  
 Caduceifera. 3. c. i. p: ax.  
  
 Empetrichia, 6. c. i. p: ax.  
 Malleolaris, 6. c. i. p: ax.  
 Pyxidiflora, 6. c. i. p: ax.  
 Nolæflora. 6. c. i. p: ax.  
  
 Festa, 4. c. i. p: ax.  
 Fallax, 6. c. i. p: ax.  
 Parilis, 6. c. i. p: ax.  
 Viscida. 6. c. i. p. ax.  
 T t Catervæflora;

Catervæflora ; 4. c. i. t.	Verecunda. 4. c. i. lat.
Pubigera, 4. c. i. t.	Glabella. 4. c. i. t.
Mitræformis, 4. c. i. t.	Embothriifolia, 3. c. i. lat.
Tardiflora, 4. c. i. t.	Glutinosa, alt. c. i. lat.
Parviflora, 4. c. i. t.	Curvifolia : 3. c. i. lat.
Exigua, 4. c. i. t.	Squarrosoa, 6. c. i. t.
Pusilla. 4. c. i. t.	Gorteriæfolia, 4. m. i. t.
Tragulifera, 4. c. i. t.	Ampullæformis, 4. m. i. t.
Guttæflora, 4. c. i. t.	Capax, 4. m. i. t.
Curvirostris, 4. c. i. t.	Lagenæformis, 3-4. m. i. t.
Obesa, 4. c. i. t.	Jasminiflora : 3-4. m. i. t.
Gracilis, 4. c. i. t.	Pavettæflora, 4. c. i. t.
Intervallaris, 4. c. i. t.	Fasciformis, 4. m. i. t.
Quadræflora, 4. c. i. t.	Fistulæflora, 4. m. i. t.
Prolifera, 4. c. i. t.	Fragrans, 4. c. m. i. t.
Cyathiformis, 4. c. i. t.	Galiiflora, 4. c. i. t.
Pelvifloris. 4. c. i. t.	Nidiflora, 4. c. i. t.
Turrigera, 4. c. i. t.	Denticularis, 4. m. i. t.
Lacunæflora, 3-5. c. i. t.	Pulchra, 4. m. i. t.
Florida. 4. c. i. t.	Daphniflora, 4. m. i. t.
Turbiniflora, 4. c. i. t.	Pellucida. 4. m. i. t.
Bullularis, 3-4. c. i. t.	Amabilis, 4. c. i. ax.
Mucosa, 4-6. c. i. t.	Venusta; 4. c. i. ax.
Piluliformis, 4-5. c. i. t.	Imbellis, 2. c. i. ax.
Obliqua, 6. c. i. lat.	Linifolia, 2. c. i. ax.
Sequax, 4-6. c. i. t.	Borboniæfolia, 2. c. i. ax.
Blenna. 4-5. c. i. t.	Corifolia,

*Corifolia*, 3. c. i. ax.  
*Obvallaris*, 3. c. i. ax.  
*Hyssopifolia*, 3. c. i. ax.  
*Taxifolia*: 3. c. i. ax.

*Pugionifolia*, 3. c. i. p : ax.  
*Viminalis*. 3. c. i. p : ax.

Figuræ Arabicæ numerum foliorum in singulis verticillis indicant:  
 Litera *c.* filamenta calcarata, *m.* mutica; *e.* antheras exsertas, *i.* inclusas; *ax.* inflorescentiam axillarem, *p : ax.* pseudo-axillarem, *t.* terminalem, *lat.* lateralem.

## ERICA.

### Character Generis.

Corolla persistens. Antheræ 4—10, ante anthesin per foramina duo lateralia connexæ. Pericarpium membranaceum, 4—8-loculare: Valvæ 4—8, medio loculorum una cum septis ab axi dehiscentes. Semina 10—100 in singulis loculis, decidua.

Differt ab *Andromedā*, corollâ non deciduâ, et structurâ antherarum: a *Menziesiā*, præter easdem notas, necnon fructu; ad quam *Erica Dabœcii* referenda.

### Characteres Specierum.

E. caule pubescentulo: corolla  $\frac{3}{4}$ -lineari, lævi; tubo cyathiformi: filamentis muticis: stigmate peltato. *Scoparia.*

E. fucata. *Thunb. Diff. n. 9.* E. *scoparia*. *Linn. Mant. p. 372.* E. *scoparia*. *Linn. Diff. n. 13. cum fig. floris.*

E. coris folio 1111. *Clus. Hist. Pl. lib. 1. p. 42.*

Cum suâ *Arboreâ* in Horto Cliffortiano olim confudit Linnè, neque postea filamenta esse mutica unquam animadvertis.

T t 2

E. *pedunculis*

*Spiculifolia.* E. pedunculis ebraeatis: calyce breviter 4-fido: corollâ 1-linearî, lævi; tubo cyathiformi, 4-angulo: filamentis muticis.

E. olympiaca. *Sibth. MS.*

Sponte nascentem in summitate Montis *Olympus*, legit heu defunctus Sibthorpe.

Persingularis est defectus bractearum.

*Virgularis,* E. foliorum laminis plus minus ovatis: corollâ  $\frac{2}{3}$ —1-linearî, viscidâ; tubo sphærico: stigmate peltato.

Variat  $\alpha$ : E. absinthoides. *Linn. Mant. p. 66.*

$\beta$ : E. virgata  $\beta$ . *Thunb. Diff. n. 18.*

$\gamma$ : E. virgata  $\gamma$ . *Thunb. Diff. n. 18.*

$\delta$ : E. hispidula. *Linn. Suppl. p. 222.*

$\epsilon$ : E. hispida. *Thunb. Diff. n. 20.*

Ab hisce omnibus longe discrepat E. virgata  $\delta$ . *Thunb.* quæ, ni fallor, *Salaxis* est.

*Asperifolia,* E. foliorum laminis linearibus: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -linearî, viscidâ; tubo sphærico: filamentis sæpius calcariis: pericarpio lanato.

E. setacea. *Andr. Er. n. 62. cum Ic. bonâ.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

*Ferox.* E. calycce ferrato: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -linearî, lævi; tubo ventricoso, dein iterum dilatato: pericarpio glabro.

E. totta. *Thunb. Diff. n. 17.*

Sponte nascentem in *Konde Bockveldt*, legit F. Masson. Bractæ 3 juxta calycem.

*Oxycoccifolia,* E. caule decumbente, filiformi: foliorum laminis ovatis:

ovatis: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari, campanulatâ, hirsutâ: filamentis muticis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, solo humido, legit I. Mulder.

Pulchella species: utinam ad vivam accuratius describere mihi quandoque liceat: tum caulis, tum folia *Oxycoccum Palustrem* ad amussim simulant.

E. caule diffuso: foliorum laminis ovatis: corollâ  $1-1\frac{1}{2}$ -lineari: filamentis basi valde dilatatis: pericarpio hirsuto.

Variat  $\alpha$ : Corolla  $1$ -linearis, viscidio-pubescentis. Antheræ inclusæ.

E. planifolia. *Thunb. Diff. n. 60.* E. planifolia. *Berg. Pl. Cap. p. 10.* E. planifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 508.*

$\beta$ : Corolla  $1\frac{1}{2}$ -linearis, minutissime viscidio-pubescentis. Antheræ exsertæ.

E. planifolia. *Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 362.*  
E. africana hirsuta, &c. *Pluken. Mant. p. 69. tab. 347. pl. 1.*

$\gamma$ : Corolla  $1\frac{1}{2}$ -linearis, lævis. Antheræ exsertæ.

E. thymifolia. *Wendl. Obs. p. 48.*

Margo foliorum in omnibus constanter recurvulus.

E. foliorum laminis fetulosis: bracteis 2, minutis: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari, lævi: calcaribus subulatis, hirtis.

E. strigosa. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 17.* E. arborea. *Thunb. Diff. n. 63.*

Sponte nascentem in *Tafelberg*, legit F. Masson.

Variat floribus albis purpureisque.

*Thymifolia.*

*Axillaris.*

E. foliorum

*Sicafolia.*

E. foliorum laminis mucronatis: corollâ  $1\frac{2}{3}$ -lineari,  
extus hirsutâ; tubo cyathiformi: calcaribus line-  
ari-attenuatis: pericarpio glabro.  
Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mûlder.  
Nulli mihi cognitæ affinis est.

*Urceolaris,*

E. foliorum laminis setosis: corollâ 3-lineari, extus  
pubescente; tubo urceolari: calcaribus linearis-at-  
tenuatis.  
E. dura. *Soland. MS.* E. hirta. *Thunb. Diff. n. 56.*  
Flores pallide purpurei.

*Faufa,*

E. foliorum laminis setosis: corollâ  $2\frac{1}{3}$ -lineari, extus  
pubescente; tubo urceolari: calcaribus aurito-at-  
tenuatis, valde ferratis.  
Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, solo humido,  
legit I. Mulder.  
Valde similis antecedenti: sed Foliorum laminæ basi  
latiores; Pubescentia alia; et Antheræ omnino di-  
versæ, in hac lineares seu totæ æqualis latitudinis,  
in illâ versus apicem sensim angustatæ.

*Pallida,*

E. foliorum laminis linearibus: calyce lateribus redu-  
plicato: corollâ 2-lineari, utrinque pubescente:  
calcaribus brevibus.  
E. pubescens pilosa. *Thunb. Diff. n. 61.* E. pubescens.  
*Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 506.* auctoritate speciminis in  
eius herbario a *Burman*.  
Variat magnitudine et pubescentiâ foliorum; sed, ni  
fallor, constanter 3-na sunt.

E. foliorum

*E. foliorum* laminis anguste linearibus : calyce planiusculo : corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari, utrinque tomentosa : calcaribus longis, recurvis.

*Tomentosa*,

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

Braëteæ juxta basin pedunculi sitæ, cum quo et calyce corollæ concolores.

*E. foliorum* laminis linear-i-lanceolatis : corollâ 2-lineari, extus pubescente ; tubo ovato : calcaribus minutis, auricularibus.

*Auricularis*,

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

Herba fequentis : cæterum ab omnibus hujus cohortis, calcaribus minutis fere ut in *Galiflorā*, diversa.

*E. foliorum* laminis linear-i-lanceolatis: corollâ 3-lineari, tubo pyramidali, extus pubescente : calcaribus glabris.

*Lamellaris*,

*E. urceolaris*. *Pl. Kew.* t. 16. *E. urceolaris*. *Berg.* *Pl. Cap.* p. 107. *E. pentaphylla*. *Linn. Sp. Pl. ed. 2.* p. 506. *E. caffra*. *Linn. Sp. Pl. ed. 1. et 2.* auctoriitate speciminis *Cliffortiani*.

Nulla pars in hac specie *urceolaris* est : a foliis longis planiusculis, titulum saltem non falsum offero.

*E. foliorum* laminis late ovatis, planiusculis : corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari, utrinque pubescente ; tubo ovato : calcaribus pubescentibus.

*Marifolia*,

*E. marifolia*.

*E. marifolia*. *Andr.* *Er.* n. 29. *cum Ic.* *E. marifolia*.  
*Pl. Kew.* t. 14. *optima*. *E. marifolia*. *Soland.* in *Ait.*  
*Hort. Kew.* v. 2. p. 15.

Sponte nascentem juxta *Constantia* abunde, legit *F.*  
*Masson.*

*Helianthemifolia*. *E.* foliis 2-nis; laminis obovatis planiusculis: corollâ  
 2-lineari, utrinque pubescente: calcaribus longis.

*E* Promontorio *Cap.*

Communicavit primum cum viginti aliis speciebus  
*Georgius Hibbert*, ob raras difficillimasque stirpes  
 quas introduxit, merito celebris.

*Calathiflora*. *E.* calyce tomentoso: corollâ 1-lineari, lævi: calca-  
 ribus cuneatis, hirtis: pericarpio tomentoso: stig-  
 mate longe exerto.  
*E. bicolor*. *Thunb.* *Diff.* n. 57.

*Proceræ*, *E.* caule tomentoso: bracteis approximatis: calyce  
 basi medioliformi: corollâ 1—2-lineari: stigmate  
 peltato.

*E. scoparia*. *Thunb.* *Diff.* n. 80. *E. arborea*. *Linn.*  
*Diff.* n. 14. *cum fig. floris*. *E. caffra*. *Linn.* *Diff.* n. 22.  
*cum fig. floris*. auctoritate speciminum ad quæ ibi  
 descripsit. *E. triflora*. *Berg.* *Pl. Cap.* p. 118. *E. ar-  
 borea*. *Linn.* *Sp. Pl. ed. 2.* p. 502. *E. scoparia*.  
*Linn.* *Sp. Pl. ed. 1.* p. 353, exclusis synonymis.  
*E. coris* folio 1. *Clus. Hist. Pl. lib. 1.* p. 41.

Sponte nascentem juxta *Baia*, legit amicissimus Smith.  
 Variat admodum in diversis regionibus, stigmate etiam  
 inclusò.

*E. caule*

E. caule tomentoso: bracteis remotis: calyce basi sensim angustato: corollâ  $1\frac{1}{2}$ —2-lineari: calcaribus cuneatis.

Sponte nascentem prope *Lisboa*, legit Banks.

Prioris nonnullis varietatibus similis, sed hæc mihi videtur legitima species. Foliorum laminæ angustiores, magis attenuatæ. Flores in nostrâ stirpe cultâ plane inodori. Corolla oblonga: tubo poculiformi. Stigma fibulæ-forme, nec late peltatum. Pericarpium pyriforme.

E. caule divaricato: foliorum laminis linearibus: *Tenuis*.  
corollâ  $\frac{3}{4}$ -lineari, campanulatâ, lævi: filamentis brevissimis: calcaribus linearî-attenuatis.

E. divaricata. *Hortulanis*.

E. caule glabro: foliorum laminis argute reduplicatis: *Humilis*.  
corollâ  $2\frac{1}{2}$ -lineari: calcaribus longis, subulatis, hirtis.

E. depressa. *Thunb.* *Diff. n. 50. cum Ic.*

E. foliorum laminis linearibus: corollâ 3-lineari: *Peduncularis*.  
tubo globoſo: antheris longissime foraminosis, lanatis.

E. rubens. *Thunb.* *Diff. n. 83.*

Sponte nascentem in *Koude Bockveldt*, montibus, legit F. Masson.

Pedunculi pollicem longi sunt.

E. foliorum laminis lanceolatis: corollâ 4—5-lineari; *Amæna*.  
tubo urceolari; limbo brevissimo: antheris breviter foraminosis, glabris.

E. incarnata. *Thunb. Diff. n. 84.*

Toto cœlo diversa ab E. *incarnatâ* hortulanorum, et non nisi ex specimine *Thunbergiano* mihi cognita.

*Glomiflora,* E. foliorum laminis anguste cuneatis: calyce bracteis imbricato: corollâ  $2\frac{1}{2}$ -lineari, viscidâ; tubo sphærico: calcaribus villosissimis.

E. vesicaria. *Soland. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

*Formosa.* E. calyce incurvo-deflexo: corollâ  $1\frac{1}{4}$ -lineari, viscidâ; tubo sphærico, 8-angulo: antheris basi valde arcuatâ: stigmate lato.

E. formosa. *Thunb. Diff. n. 82. cum Ic.*

Sponte nascentem in *Lange Kloof*, regionibus orientalibus, legit F. Masson.

*Carduifolia.* E. foliorum laminis setosis: pedunculis longis: corollâ  $2\frac{1}{2}$ -lineari, lævi; tubo globoso: filamentis brevissimis.

Communicavit *Hibbert.*

Inflorescentia adhuc mihi dubia: forte in rudimentis ramulorum terminalis. Stigma angustum.

*Tubercularis.* E. corollâ  $1\frac{1}{3}$ -lineari, tuberculis asperâ; tubo globoso: filamentis muticis: pericarpio longe stipitato.

E. inclyta. *Soland. MS.*

Antheræ minutæ, totæ læves.

*Campanularis.* E. caule glabro: foliorum laminis angustis: corollâ  $2\frac{1}{2}$ -lineari,

$2\frac{1}{2}$ -lineari, campanulatâ, lævi: filamentis brevissimis, muticis.

E. tenuifolia. *Hortulanis.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, locis humidis, legit F. Masson.

Flos Convallariæ majalis *Linn.* sed luteus.

E. calyce tetraphyllo: corollâ  $4\frac{1}{2}$ -lineari, lævi; tubo medioliformi; limbo basi integro: antheris papulosis. *Medioliflora.*

E. Thunbergii. *Linn. Suppl. p. 220.*

Genus jam tanto nomini sacratur, nec cum specificis, hujusmodi titulos miscendos esse censeo.

E. floribus glomeratis; corollâ  $1\frac{1}{3}$ -lineari; limbo tubo  $\frac{1}{2}$  longiore, laciniis semiorbicularibus: stigmate lato. *Blanda,*

E. cornuta. *Roxb. MS.*

In hac pulcherrimâ cohorte, Antheræ ipsæ ultra foramen in cristam plus minus producuntur.

E. calycis foliolis ferrulatis: corollâ  $2\frac{1}{2}$ -lineari; limbo basi integro, emarginulato: filamentis calcaratis. *Hottoniaflora,*

E. cubica. *Andr. Er. n. 39. cum Ic. malâ. E. cubica.*

*Linn. Mant. p. 233.*

E. calycis foliolis minute ciliatis: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari; *Seriphliifolia,* limbo basi integro, obtuso: filamentis muticis.

E. cubica. *Thunb. Diff. n. 46.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, montibus, legit I. Mulder.

Nullam cubicam partem in his duabus speciebus unquam detegere potui: præter notas autem supra

memoratas, discrepant Proportione, situ Bractearum, et colore Antherarum. Flores in utraque axillares.

*Lavandulæfolia*, E. caule incano : bracteis juxta calycem : corollâ 2-lineari ; tubo 4-angulo ; limbo incurvo : filamentis inferne latissimis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

*Humifusa*, E. foliis 2-nis ; laminis ovalibus ; corollâ  $1\frac{1}{3}$ -lineari, limbo ampio : stylo longe exerto.

E. humifusa. *Hibbert MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

Herba tota glabra videtur.

*Crißæflora*, E. calyce tetraphyllo : corollâ 2-lineari ; limbo tubo triplo longiore, basi integro : pericarpio lævi.

E. melanthera. *Thunb. Diff. n.* 12.

Sponte nascentem prope *Constantia*, legit I. Mulder.

*Lysimachiaeflora*, E. calyce quadrifido : corollâ 2-lineari ; limbo tubo duplo longiore, basi integro : pericarpio sericeo.

E. melanthera. *Linn. Mant. p.* 232,  
Stigma in hac longe exsertum.

*Passerinæfolia* : E. bracteis minutis : calyce breviter quadrifido, dense tomentoso : corollâ  $2\frac{1}{2}$ -lineari : pericarpio tomentoso.

E. passerinæ. *Linn. Suppl. p.* 221. E. Cap. Coridis fol.

fol. fl. rubello. *Pet. Gaz.* t. 3. f. 7. *Cat. Top.*  
n. 469.

Folia in nostris exemplaribus terna.

E. calyce dense sericeo, bracteis imbricato, quadri- *Byffina*,  
fido: corollâ 2-lineari, calyce parum longiore:  
nectario cotyliformi, rare hirto.

E. capitata. *Andr. Er.* n. 38. *cum Ic.* E. capitata.  
*Linn. Mant.* p. 373. E. capitata. *Linn. Diff.* n. 36.  
*cum fig. floris.* E. capitata. *Berg. Pl. Cap.* p. 94.

E. africana calyce lanuginoso &c. *Seb. Thes.* v. 1.  
p. 30. t. 20. f. 1.

Flores pallide lutei: antheris sæpius inclusis.

E. calyce dense sericeo, bracteis remoto, quadrifido: *Velleriflora*,  
corollâ  $1\frac{3}{4}$ -lineari, calyce parum longiore: nectario  
cotyliformi, glabro.

E. bruniades. *Andr. Er.* n. 61. *cum Ic.* E. capitata.  
*Thunb. Diff.* n. 15. auctoritate ejus speciminis. Erio-  
cephalos Bruniades æthiopica, Corios, &c. *Pluken.*  
*Mant.* p. 69. t. 347. f. 9. auctoritate ejus speci-  
minis.

Sponte nascentem in *Drakenstein*, locis humidis, legit  
F. Masson.

Flores pallide purpurei.

E. calyce dense sericeo, bracteis remoto, tetraphyllo: *Carbasina*,  
corollâ  $1\frac{3}{4}$ -lineari, calyce multo longiore: nectario  
astragaliformi, sericeo.

E. bruniades. *Linn. Mant.* p. 378. E. bruniades.  
*Linn. Diff.* n. 52. *cum fig. floris.*

Flores albidi, pallide rosei, vel etiam lutei: dignoscas

autem

autem a *Byssinā*, bracteis calyce remotis; a *Vellerifordā*, foliis latioribus et magis tomentosis.

- Scariosa*, E. bracteis suborbiculatis: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari; limbo longitudine tubi; laciniis semilanceolatis: stigmate angusto.  
 E. scariosa. *Berg. Pl. Cap.* p. 102. E. spumosa. *Berg. Pl. Cap.* p. 103. auctoritate speciminum, quæ amicissimo *Swartz* debo. E. spumosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2.* p. 508. Nullam differentiam extricare potui in speciminibus Bergianis: hoc modo ante plenam explicationem florum, illud diu post, decerptum fuisse videtur. Filamenta rite calcarata sunt. Antheræ in herbariis cito caducæ.
- Sexfaria*, E. foliis glabris; corollâ  $1\frac{1}{3}$ -lineari, calyce obtectâ: calcaribus longis, marginalibus: pericarpio lœvi.  
 E. sexfaria. *Pl. Kew. f.* 11. E. spumosa. *Thunb. Diff.* n. 14. Antheræ hujus quoque post exsiccationem mox cadunt, proculdubio exsertæ.
- Corydalis*, E. foliorum laminis lanceolato-cuneatis: corollâ 2-lineari, limbo basi integro: antheris dorso alatis. Communicavit *Hibbert*. Nomen ab antheris galeam aliquatenus referentibus.
- Azaleæfolia*, E. foliorum laminis lanceolatis: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari, hirtâ: antheris exsertis, pene totis foraminosis.  
 E. spumosa. *Roxb. MS.* Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.
- Petiolaris*, E. petiolis longis, cuneatis, fimbriatis: corollâ  $2\frac{1}{3}$ -lineari, apice pubescentulâ: pericarpio rare hirto.  
 E. petiolata.

E. petiolata. *Thunb. Diff. n. 7. cum Ic. bonâ.*

Facies Rosmarini Officinalis, *Linn.*

E. foliis vesiculis nigris aspersis: corollâ 1-linearis, *Vesicularis*, viscidio-pubescente: calcaribus parallelis, cuneatis: pericarpio sericeo.

E. conacea. *Hortulanis.*

Sponte nascentem prope *Stellenbosch* inter montes, legit I. Mulder.

Frutex 3-pedalis; ramis erectis, valde fastigiatis.

E. foliis viscidis: corollâ  $2\frac{1}{3}$ -linearis, limbo recurvo: calcaribus aurito-cuneatis, hirtis: pericarpio lœvi. *Verniciflua,*

E. glutinosa. *Roxb. MS.*

Foliorum laminæ obtuse acuminulatæ, reduplicaturâ dense glandulosæ, unde nitent glutine effuso.

E. foliorum laminis ovalibus, pubescentibus: corollâ 2-linearis, limbo recurvo: calcaribus longis, angustè cuneatis. *Lachneæfolia,*

E. lachnæa. *Hortulanis.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

Differt ab antecedente foliorum laminis penitus obtusis, nec viscidis: calcaribus lœvibus.

E. foliis lucidis: calycis lateribus inferne recurvis: corollâ  $1\frac{2}{3}$ -linearis; limbo revoluto: filamentis sæpe muticis: pericarpio tomentoso. *Volutæflora,*

E. nigrita. *Thunb. Diff. n. 53. E. nigrita. Linn. Diff. n. 11. cum fig. floris, pessimâ. E. nigrita. Linn. Mant. p. 65. E. laricina. Berg. Pl. Cap. p. 94. E. africana, &c. Seb. Thes. v. 2. p. 11. t. 9. f. 7.*

Calcaria brevia, parallela, cuneata, interdum omnino deficiunt.

*Lyrigera*, E. foliis lucidis: corollâ  $1\frac{2}{3}$ -lineari; limbo recurvo: calcaribus ferratis: antheris lyræformibus, hirtis: pericarpio tomentoso.

E. nigrita. Roxb. MS.

Hujusce speciei diagnosis pulcherrima, antheris ante anthesin tot lyras referentibus.

*Salax*, E. foliis lucidis; calyce adpresso: corollâ  $1\frac{2}{3}$  lineari: filamentis brevissimis: pericarpio lævi: stigmate lato.

E. ramosissima. Roxb. MS.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, montibus, legit F. Masson.

Facies *Volutæfloræ*, sed præter differentias supra datas, corollæ laciniæ in hac, ni fallor, basi distinctæ.

*Gnidiaefolia*, E. foliorum laminis linearis-lanceolatis, pubescentulis: calyce late obcuneato: corollâ 2-lineari: calcaribus auricularibus.

E. vespertina. Linn. Suppl. p. 221. E. calycina. Thunb. Diff. n. 78. E. calycina. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 507.

*Cumuliflora*, E. fasciculis 7—12-floris: calyce incano: corollâ  $2\frac{1}{2}$ -lineari; limbo inferne ciliato: pericarpio hirto: stigmate angusto.

E. aggregata. Roxb. MS.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

E. fasciculis

E. fasciculis 3-floris: calyce viscido: corollâ 2-lineari; *Genistæfolia*,  
limbo inferne ciliato: pericarpio lævi: stigmate lato.

E. tetraloba. *Roxb. MS.*

Species ab antecedente penitus distincta; huic semina  
lævia, minute alveolata; illi lucida, æquata.

E. foliorum laminis lanceolato-cuneatis: pedunculis *Periplocasflora*,  
longis: calyce brevi, orbiculari: corollâ  $1\frac{1}{2}$ —2-li-  
nari: stigmate angusto.

Communicavit *Hibbert*.

Flores in siccis saturate purpurei. Filamenta sæpius  
calcaribus brevibus cuneatis armata, interdum vero  
prorsus mutica.

E. calyce minute ciliato, lucido: corollâ 1-linearis: *Lucida*,  
calcaribus auricularibus, inciso-ferratis: stigmate an-  
gusto, inclusa.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

E. bracteis calyceque integerrimis: corollâ 1-linearis: *Munda*,  
calcaribus auricularibus, ciliatis: pericarpio hirsuto.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

Specimen nostrum imperfectum est, ante explicationem  
florum lectum.

E. calyce patente, margine exquisite glanduloso: co- *Gnaphaliflora*,  
rollâ 1-linearis, calyce vix longiore: pericarpio lævi:  
stigmate grandi 4-fido.

E. gnaphalodes. *Thunb. Diff. n. 75.* E. gnaphalodes.  
*Linn. Diff. n. 25. cum fig. floris*, pessimâ. E. gnapha-  
lodes. *Berg. Pl. Cap. p. 119.*

*Fabrilis;*

E. foliis dense imbricatis: corollâ 1-lineari, calyce vix longiore; calcaribus integerimis: antheris minutis, pene didymis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson. Herba recta, quasi Fabri manu artificiose imposita.

*Dianthifolia;* E. foliis 2-nis, longis: calyce ovato-cuneato: corollâ 3-lineari: calcaribus ferratis: pericarpio glabro.

Communicavit *Hibbert*.

Flores pallidissime purpurei.

*Brevifolia,* E. foliorum laminis ovatis: corollâ  $1\frac{2}{3}$ -lineari, calyce  $\frac{1}{2}$  longiore: calcaribus linear-i-attenuatis: feminibus striatis.

E. brevifolia. *Soland. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

*Chlamydiflora,* E. foliorum laminis linearibus, hirsutis; corollâ 2-lineari, calyce vix longiore: calcaribus auricularibus: feminibus æquatis.

E. viscaria. *Roxb. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson. Calycis foliola fere distincta, erecto-recurva.

*Selaginifolia.* E. caule tomentoso: corollâ  $1\frac{2}{3}$ -lineari, lævi: tubo globoso: calcaribus latissimis, orbicularibus.

Sponte nascentem in *Lange Kloof*, legit G. Paterson: Omnia specierum, quas detexerunt *Roxburgh*, *Paterson*, *Masson*, largo suo more copiam mihi fecit, sumum nostræ ætatis decus, *Banks*.

E. foliorum

E. foliorum laminis parum reduplicatis: corollâ 2-lineari, lanatâ: filamentis latis, breviter calcaratis: stylo exserto. *Pannoſa.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.  
Affinitatem nescio: confer cum *Byſſinā*, sed folia videntur 4-na et antheræ diversissimæ.

E. bracteis calyceque pilosissimis: corollâ 2-lineari, hirtâ, 4—5-andrâ: filamentis apice latissimis, muticis. *Hirsuta,*

E. hirsuta. *Thunb. Prodr. p. 72.*

E. foliis 4-nis, minutis: calyce pilosissimo: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari, hirtâ, 4—5-andrâ: filamentis calcaratis. *Plumosa,*

E. plumosa. *Thunb. Prodr. p. 73.* *Blæria ciliaris. Linn.*  
*Suppl. p. 122.*

Nomen pessimum est, verum ex frustulo nostro aliud aptum excogitare nequeo.

E. foliis 3-nis, minutis: calyce pilosissimo, bracteis distincto: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari, hirtâ, 4-andrâ: filamentis muticis. *Ciliciiflora,*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.  
Antheræ pene didymæ, valde barbatæ.

E. foliis 3-nis: laminis valde incurvis: calyce lanato, *Xeranthemifolia*, imbricato: corollâ  $1\frac{3}{4}$ -lineari, lanatâ, 4-andrâ.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, solo arido, legit F. Masson.

Facies diversissimi generis.

*Nodiflora*,

E. foliis 3-nis: calyce infundibuliformi, villosissimo: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari, hirtâ, 4-andrâ: antheris breviter foraminosis.

Communicavit *Hibbert*.

Folia villosa, nec lanata.

*Flosculosa*,

E. calyce fimbriato: corollâ  $\frac{3}{4}$ -lineari; tubo angustissimo, superne repente dilatato; 4-andrâ: filamentis angustissimis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

Corolla refert flosculum disci in Ordine Naturali Compositarum.

*Exilis*,

E. foliis 4-nis: calyce infundibuliformi, glabro: corollâ  $\frac{3}{4}$ -lineari, glabrâ, 4-andrâ: filamentis muticis.

E. scabra. *Thunb. Prodr.* p. 72.

Inflorescentiam non rite intelligo, specimen enim unicum dilacerare nolui: videtur axillaris bracteis duabus in pedunculo brevissimo.

*Labialis*,

E. foliis 3-nis; laminis glabris: calyce 2-labiato, fimbriato: corollâ  $1\frac{1}{3}$ -lineari, 2-labiata, 4—5-andrâ.

Blæria labiata. *Soland. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

*Embolifera*,

E. bracteis solitariis: calyce infundibuliformi, quadran-gulo: corollâ 2-lineari, 4-andrâ: calcaribus recte de-flexis.

E. glabella. *Thunb. Prodr.* p. 73. Blæria pusilla. *Linn. Mant.* p. 39. auctoritate ejus speciminis. Blæria pur-purea. *Berg. Pl. Cap.* p. 34.

Folia,

Folia, in numerosissimis quæ vidi, tam cultis, quam indigenis exemplaribus, sunt hirsuta. Inflorescentia, ut in aliis hujuscē cohortis est spica fasciculum mentiens, pedunculis brevissimis verticillatis; bracteā loco folii singulis subiectā.

E. foliorum laminis fimbriatis, subtus glabris: corollā  $1\frac{1}{2}$ -lineari, 4—5-andrā: calcaribus recte existantibus. *Dumosa*,

E. Blæria. Thunb. Prodr. p. 72. Blæria ericoides. Linn.  
Sp. Pl. ed. 2. p. 162.

E. calyce bracteis imbricato, profunde 4-fido, barbato: corollā 2-lineari, glabrā, 4—5-andrā: filamentis multicis: stylo angustissimo. *Barbigeria*,

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

E. bracteis solitariis: calyce infundibuliformi, toto hirsuto: corollā  $1\frac{1}{2}$ -lineari, 4—5-andrā: filamentis multicis. *Paleacea*,

E. articulata. Thunb. Prodr. p. 71. Blæria articulata. Linn. Mant. p. 198.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson. Herba valde ludit; foliorum verticillis nunc distinctis quasi caulis articulatus esset, nunc approximatis; laminis nunc brevibus, nunc longis et linearibus.

E. foliis longis: bracteis juxta calycem, exteriore longissimā: corollā  $1\frac{1}{2}$ -lineari, 6-andrā: filamentis calcaratis. *Bruniæfolia*,

E. hemisphærica. Soland. MS.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

E. pedunculis

- Turmalis,* E. pedunculis brevissimis: calyce minuto, adpresso: corollâ 2-lineari, 4—5-andrâ: filamentis muticis: antheris latis.  
 Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.  
 Facies antecedentis, sed penitus distincta, calyce triplo minore.
- Equisetifolia,* E. foliis 3-nis: fasciculis 3—5-floris: pedunculis longis, glabris: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari, 4—5-andra: filamentis muticis.  
 E. articulatis. *Hortulanis.*  
 Herba ut in *Imbelli*, sed etiam gracilior.
- Sertiflora,* E. calyce anguste cuneato: corollâ  $1\frac{1}{3}$ -lineari; tubo urceolari: antheris totis exsertis: pericarpio lævi.  
 E. nudiflora. *Smith Pl. Ic. ined. n. 57!* E. nudiflora. Linn. Mant. p. 229.  
 Sponte nascentem in *Taffelberg*, legit G. Paterson.  
 Bracteæ, minutæ quidem, pro certo adsunt in exemplare Linnæano!
- Diotæflora.* E. calyce late cuneato: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari; tubo amphoræformi: antheris parum exsertis: pericarpio pubescente.  
 E. pistillaris. *Soland. MS.*  
 Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.  
 Flores in rudimentis ramulorum axillaribus.
- Flexilis.* E. pedunculis viscidis, axillaribus: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari; tubo ovato: filamentis muticis: pericarpio lanato.  
 E. racemosa.

*E. racemosa*. *Thunb.* *Diff.* n. 47. *cum Ic.*

Inflorescentia in axillis simplex, nec racemosa.

*E. foliorum* laminis argute reduplicatis : corollâ  $2\frac{1}{3}$ -lineari ; tubo pyramidali : antheris a medio foraminosis. *Saxatilis*,

*E. carnea*. *Curt. Bot. Mag.* n. 11. *cum Ic.* mediocri. *E. carnea*. *Jacq. Fl. Austr.* v. 1. p. 21. f. 31. *E. carnea*. *Scop.* *Fl. Carn.* ed. 2. v. 1. p. 275. *E. purpurascens*. *Linn.* *Diff.* n. 55. *E. herbacea*. *Linn.* *Diff.* n. 57. *cum fig. floris*. *E. foliis*, &c. *Hall. Hist. Helv.* n. 1013. *E. herbacea*. *Linn. Sp. Pl.* ed. 2. p. 501. *E. carnea*. *Linn. Sp. Pl.* ed. 2. p. 504. *E. purpurascens*. *Linn. Sp. Pl.* ed. 2. p. 503. exclusis omnibus synonymis præter sequens. *E. procumbens* foliis in summitate, &c. *Seg. Ver.* v. 2. p. 280. auctoritate speciminis a *Fabroni*, cui folia 5-na. *E. procumbens*, ternis foliis, carnea. *C. Baub. Pin.* p. 486. *E. procumbens* herbacea. *C. Baub. Pin.* p. 486. *E. coris* folio vii. viii. ix. *Clus. Hist. Pl. lib.* 1. p. 46.

Foliorum numerus certe ludit, adeo ut non amplius dubitaverim omnia supra citare synonyma.

*E. foliorum* laminis anguste cuneatis ; floribus secundis ; corollâ  $1\frac{1}{2}$ —2-linearis ; tubo urceolari : antheris ab infra medium foraminosis. *Lugubris*,

*E. mediterranea*. *Curt. Bot. Mag.* n. 471. *cum Ic.* *E. mediterranea*. *Linn. Mant.* p. 229. *E. mediterranea*. *Linn. Diff.* n. 59. *cum fig. floris*. *E. major* florib. &c. *C. Baub. Pin.* p. 485. *E. coris* folio 111. *Clus. Hist. Pl. lib.* 1. p. 42.

A saturo colore foliorum jamdudum distinxit *Clusius*.

*E. foliorum*

- Multiflora*, E. foliorum laminis linearibus: corollâ  $1\frac{1}{2}$ —2-lineari; tubo urceolari: antheris juxta apicem foraminosis.
- E. multiflora. *Linn. Diff. n. 58. cum fig. floris.* E. multiflora. *Linn. Sp. Pl. ed. 1. p. 355.* E. juniperifolia, &c. *Garid. Pl. Aix. p. 16c; t. 32.* E. foliis corios multiflora. *I. Baub. Hist. Pl. lib. 10. p. 356.* E. coris folio altera. 2. quæ Narb. &c. *Clus. Hist. Pl. lib. 1. p. 42.* E. juniperifol. &c. *Lob. Obs. p. 620.*
- Flores quoquoversi, pedunculis longiusculis.

*Manipuliflora*, E. caule incano: floribus in axillis interruptis: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari; tubo cyathiformi: antheris in fertum erectis.

E. verticillata. *Forst. Fl. p. 210.*

Juxta Bujuchtara se lectam misit amicissimus Sibthorpe.

- Vaga*. E. caule glabro: floribus in axillis contiguis: corollâ  $1\frac{1}{3}$ -lineari; tubo cyathiformi: antheris in fertum erectis.
- E. vagans. *Smith in Engl. Bot. n. 3. cum Ic.* E. multiflora. *Bulliard Fl. Par. t. 203.* E. didyma. *Stokes in Witb. Arr. ed. 2. p. 400.* E. purpurascens. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 1. p. 488.* E. vagans. *Linn. Mant. p. 230.* E. vagans. *Linn. Diff. n. 56. cum fig. floris.* E. foliis corios multiflora. *Ray Syn. ed. 3. p. 471.* E. procumbens dilute purpurea. *C. Baub. Pin. p. 486.*
- Antheræ non revera didymæ.

- Lentiformis*. E. bracteis calyci adpressis: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari; tubo lentiformi, basi 8-angulo: antheris juxta apicem foraminosis.

E. umbellata.

E. umbellata. *Pl. Kew.* t. 5. E. umbellata. *Linn. Sp.*  
*Pl. ed. 2. p. 501.* E. umbellata. *Loefl. Ref.* p. 138.

E. coris folio v. *Clus. Hist. Pl. lib. 1. p. 43.*

Flores ramis ultra folia productis terminales, nec umbellati.

E. foliis 3—4-nis: corollâ 2-lineari, viscidâ; tubo ovato: antheris latis, exsertis, hirtis: pericarpio turbinato, hirto. *Pudibunda.*

E. nutans. *Wendl. Er. fasc. 3. p. 5. cum Ic.*

Hanc unice omnium quas proposui Ericarum, non vidi: icones autem a *Wenaland*, si rudes, fidelissimæ.

E. bracteis juxta calycem: corollâ 1-lineari, glabrâ; limbo recurvo: antheris longe foraminosis: stigmate angusto. *Filiformis;*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder. Caulis-tenuis, diffusus. Folia 3-na, verticillis remotis: Laminæ angustæ, recurvæ, viscido-pubescentes. Flores terminales. Filamenta ad apicem lata. Pericarpium læve.

E. pedunculis brevissimis: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari, hirtâ; tubo modiali: calcaribus cuneatis: antheris brevissimis. *Turgida.*

E. fusco-rubens. *Roxb. MS.*

E. calyce bracteis remoto, cuneato, longitudine mire vario: corollâ 4—7-lineari, lævi; tubo ovato-pyramidalis. *Fusiformis;*

VOL. VI.

Y y

Variat

Variat  $\alpha$ : Calyx  $1\frac{1}{3}$ -linearis. Corolla punicea, 6—7-linearis.

E. Pluknetii. *Linn. Sp. Pl. ed. 1.* p. 356.

$\beta$ : Calyx  $2\frac{1}{2}$ —3-linearis. Corolla punicea, 6—7-linearis.

E. Pluknetiana. *Pl. Kew. t. 9.* optima.

E. Pluknetii. *Linn. Sp. Pl. ed. 2.* p. 506.  
exclusis synonymis.

$\gamma$ : Calyx 1-linearis. Corolla albida,  $3—3\frac{1}{2}$ -linearis.

E. Petiverii  $\beta$ . *Thunb. Diff. n. 21.*

$\delta$ : Calyx  $2\frac{1}{2}$ -linearis. Corolla albida  $3—3\frac{1}{2}$ -linearis.

In nostro horto, cæteris elatior.

$\epsilon$ : Calyx 5-linearis. Corolla albida, 5-linearis.

Postrema varietas maxime insignis est.

*Fragilis*; E. foliorum laminis acute mucronatis: corollâ 7—9-linearis; limbo recurvo-horizontali: pericarpio barbato.

E. Banksia. *Andr. Er. n. 26. cum Ic.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, locis rupestribus, legit F. Masson.

*Vestiflora*, E. foliorum laminis incurvo-patentibus, junioribus pilosis: floribus solitariis: corollâ 7—9-linearis; tubo cylindraceo.

E. Petiveriana. *Roxb. MS.*

Corolla rufa.

*Baculiflora*, E. foliorum laminis recurvo-patentibus: floribus solitariis:

litaris : corollâ 6—8-lineari ; tubo cylindraceo : pericarpio ovato.

Variat  $\alpha$  : Corolla lutea.

E. Petiveri. *Linn. Mant.* p. 235. E. Petiveri.

*Linn. Diff.* n. 50. cum fig. floris.

$\beta$  : Corolla fordidè rufa.

E. Petiverii  $\alpha$ . *Thunb. Diff.* n. 21.

Limbus Corollæ obtusus, et instar affinum crenulatus  
in ipso specimine Linnæano.

E. foliorum laminis recurvo-patentibus ; corollâ 7—9-lineari ; tubo cylindraceo basi ventricosâ : pericarpio ovali. *Cotburnalis*,

Variat  $\alpha$  : Bracteæ et Calyx glabriusculeæ.

E. Sebana. *Pl. Kew. t.* 10. optima. E. coccinea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 505. E. africana, &c. *Seb. Thes. v. 1. p.* 32. *t. 21. f. 4.*

$\beta$  : Bracteæ et Calyx pubescentes.

E. Pluknetii. *Berg. Pl. Cap. p.* 92.

Corolla in utraque lète rufa, et demum 4-angula.

E. foliorum laminis recurvo-patentibus : corollâ 4—6. *Socciflora*.  
lineari ; tubo ovato-pyramidalis : pericarpio ovato.

Variat  $\alpha$  : Corolla lutea.

E. Sebana viridis. *Andr. Er. n. 59. cum Ic.*  
bonâ.

$\beta$  : Corolla fordidè rufa.

E. Sebana fordidæ. *Hortulanis*.

$\gamma$  : Corolla lète punicea.

Y y 2

E. Petiveri.

E. Petiveri. *Hortulanis.*

Limites, quibus stirpes sub hoc et tribus præcedentibus  
titulis traditas distinguerem, vix inveni: omnes for-  
san rectius conjungenda.

*Furfurosa*, E. foliorum laminis incurvo-patentibus: corollâ 4—6-  
linearî, viscidâ: filamentis latis: nectario cotyliformi.  
E. monodelphia! *Andr. Er. n. 22. cum Ic.*  
Filamenta forte latissima hujus generis.

*Follicularis*, E. foliorum laminis patentibus: floribus solitariis: cò-  
rollâ 5—7-linearî, basi inflatâ; nectario plinthiformi.

Variat  $\alpha$ : Corollæ limbus mox ferrugineus.

E. Petiveriana. *Andr. Er. n. 25. cum Ic.* bonâ.

$\beta$ : Corollæ Limbus mox atrobadius.

E. melastoma. *Andr. Er. n. 43. cum Ic.*

Folia penultima ultimaque basi nonnihil dilatata.

*Penicilliflora*. E. corollâ 2-linearî, calyce obductâ; tubo sphærico:  
antheris in penicillum acutum convergentibus.

E. Petiveri vera! *Hortulanis.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.  
Pulchra species, bracteis calyceque niveis.

*Placentæflora*, E. foliis obtusissimis: corollâ calyce obductâ: tubo ra-  
pæformi: filamentis sensim dilatatis: stigmate an-  
gusto.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.  
Herba pallidissime incana.

E. calyce

E. bracteis imbricato: corollâ 1-lineari, longitudo calycis: antheris angustis, longis: pericarpio late gigartoideo. *Pyramidalis*,

E. imbricata. *Linn. Mant.* p. 372. E. imbricata. *Linn.*  
*Diff. n. 53. cum fig. floris.* E. quinangularis. *Berg.*  
*Pl. Cap.* p. 117. E. imbricata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2.*  
*p. 503.*

E. bracteis supra medium pedunculi sparsulis: corollâ *Squamæflora*,  $\frac{2}{3}$ -lineari, calyce breviore: antheris acuminulatis: pericarpio late ovato.

E. imbricata. *Roxb. MS.*

Sponte nascentem prope *Baay Fals*, legit I. Mulder.

E. calyce bracteis imbricato: corollâ  $\frac{2}{3}$ -lineari, calyce *Cæfir*, breviore: antheris obtusis, septo lato: pericarpio ovato.

Communicavit *Thunberg*.

Stigma latiusculum, quod in antecedente angustum.

E. bracteis supra medium pedunculi sparsulis: corollâ *Flexuosa*, 1-lineari, calyce longiore: antheris obtusis septo angusto: nectario grandi.

E. flexuosa. *Andr. Er. n. 33. cum Ic.*

Sponte nascentem juxta *Duyvelsberg* abunde, legit I. Mulder.

Pericarpium in hac turbinatum.

E. calyce bracteis imbricato: corollâ  $\frac{2}{3}$ -lineari, calyce *Lasciva*, parum

parum breviore : antheris a basi foraminosis : stigmate peltato.

E. imbricata. *Thunb. Diff. n. II.* auctoritate ejus speciminiis.

Facile dignoscas, Antheris longe foraminosis.

*Stylofa*; E. pedunculis longis : bracteis juxta calycem sparsulis : corollâ 1-linearis, calycē parum longiore : antheris acumulatis : pericarpio ovali.

E. bracteata. *Roxb. MS.*

*Stylus longissimus*.

*Spiræaflora*; E. pedunculis glabris : corollâ 1— $1\frac{1}{2}$ -linearis; limbo longitudine tubi, integerrimo : antheris juxta apicem foraminosis.

E. leucanthera. *Linn. Suppl. p. 223.*

Variat caule vix pubescente, et magnitudine florum.

*Milleflora*. E. caule tomentoso : corollâ  $\frac{2}{3}$ -linearis ; laciinis basi imbricatis : calcaribus linearibus, levibus : stigmate exerto.

E. milleflora. *Berg. Pl. Cap. p. 96.* E. paniculata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 508.*

Si quæ alia, legitima species : flores non paniculati, sed fasciculis trifloris terminalibus : a *Cyathiformi* stylo longe exerto dignoscenda.

*Diosmæfolia*. E. foliis lucidis : corollâ 2-linearis ; laciinis imbricatis : filamentis angustissimis : calcaribus exquisite attenuatis, ferrulatis.

E. subferrata. *Roxb. MS.*

Sponte

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.  
Folia latiora quam in plurimis.

E. caule angulato: foliorum laminis lanceolato-cuneatis: corollâ  $1\frac{1}{3}$ -lineari, calyce parum longiore: calcaribus auricularibus, glabris. *Palliflora*;

E. candida. *Soland. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

E. foliorum laminis cuneatis: calyce obtuse-cuneato; corollâ  $1\frac{1}{4}$ -lineari; tubo parum 4-angulo, turbinato: calcaribus anguste cuneatis. *Fugax*,

E. triflora aristata. *Wendl. Obs. p. 47.* E. triflora. *Thunb. Diff. n. 79. cum Ic.* E. triflora. *Linn. Mant. p. 374.*

E. triflora. *Linn. Diff. n. 23. cum fig. floris.*

Hujus speciei florescentia citissime peragitur: non est triflora. *Linn. Sp. Pl.* quare nomen mutavi.

E. foliorum laminis cuneatis: calyce ovato-cuneato: corollâ 2-lineari; tubo valde 4-angulo, sphærico: calcaribus late auricularibus. *Pyrolæflora*,

E. triflora. *Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 356.* exclusis synonymis.

Sponte nascentem infra *Duyvelsberg*, legit I. Mulder.

Persimilis antecedenti, sed accuratius inspecta valde differt; tubo corollæ apice intus sub sinibus limbi, in tot carinas canaliculatas, extremitate pilis aliquot minutis barbatas, prominente.

E. foliorum laminis ovalibus, pubescentibus: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari; *Tegulæfolia*,

$1\frac{1}{2}$ -lineari; tubo parum 4-angulo, turbinato: calcaribus grandibus, orbicularibus.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.  
Folia lata, et ordine recto imbricata.

*Baccæformis*. E. caule angulato: foliis saepius 4-nis: corollâ  $2\frac{1}{3}$ -lineari; tubo valde 4-angulo, turbinato: calcaribus auricularibus.

E. baccans. *Curt. Bot. Mag. n. 358.* E. baccans. *Linn.*

*Mant. p. 233.* E. africana glabra fruticosa arbuti flore. *Seb. Thes. v. 1. p. 32. t. 21. f. 3.*

Folia interdum terna: quamobrem *Corifoliam Linn. Sp. Pl. ed. 1 et 2.* ad hanc quoque pertinere suspicor.

*Modesta*: E. foliis parvis, dense imbricatis: corollâ  $3\frac{1}{2}$ -lineari, tomentosâ; tubo late ovato; limbo recurvo: calcaribus lineari-attenuatis.

Communicavit *Hibbert.*

Flores pallidissime carnei.

*Holofericea*: E. foliorum laminis argute reduplicatis: corollâ 3-lineari, holofericeâ: tubo ovato: antheris hirtis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.  
Species pulcherrima, ab omnibus huc usque cognitis eorollâ suâ holofericea facile dignoscenda. Primo intuitu *Taxifoliae* affinem esse putavi, longe autem differt, cum inflorescentiâ, tum numero bractearum.

*Glaucæ*: E. foliis glaucis, succulentulis: corollâ 3-lineari, extus rorida: calcaribus suborbicularibus.

*E. glauca.* *Andr. Er. n. 47. cum Ic.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

Caulis 3-pedalis, teres. Folia 3-na, pene Sedi Reflexi Linn. laminis tamen subtus pubescentibus. Flores terminales. Pedunculi longi, una cum bracteis, calyce et corollâ omnes livido-purpurei. Stigma inclusum.

*E. foliorum* laminis linearis-attenuatis ovatisque: calyce recurvo-patente: corollâ 7—9-linearis: pericarpio globoso, 4-angulo. *Variifolia.*

*E. Monsoniae.* *Pl. Kew. t. 7.* *E. Monsoniana.* *Thunb.*  
*Diff. n. 52. cum Ic.* *E. Monsonia.* *Linn. Suppl. p. 223.*

*E. calyce adpresso:* corollâ 7—8-linearis; limbo pyramidali, convoluto apice recurvulo: pericarpio hemisphærico. *Rupestris.*

*E. halicacaba.* *Pl. Kew. t. 2.* *E. halicacaba.* *Thunb.*  
*Diff. n. 51.* auctoritate ejus speciminis. *E. halicacaba.* *Linn. Diff. n. 3. cum fig. floris.* *E. halicacaba.* *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 507.* *E. halicacaba.* *Linn. Amœn. Acad. v. 5. p. 85.*

Sponte nascentem in *Tafelberg, Steenberg*, locis rupestribus, legit F. Masson.

*E. calyce incurvo erecto:* corollâ 8—10-linearis; tubo plus minus costato: filamentis muticis, basi dilatatis. *Verficolor,*

Variat  $\alpha$ : Folia viridia. Corolla coccinea: tubo parum costato. Antheræ basi recte emarginatae.

*E. versicolor.* *Andr. Er. n. 12. cum Ic.*

$\beta$ : Folia viridia. Corolla saturate coccinea : tubo parum costato. Antheræ basi sursum obliquæ.

Communicavit G. Aiton, princeps hortulanorum.

$\gamma$ : Folia cæsia. Corolla saturate coccinea : tubo parum costato. Antheræ basi sursum obliquæ.

E. discolor coccinea. *Hortulanis*.

$\delta$ : Folia cæsia. Corolla rosea : tubo valde costato. Antheræ basi deorsum obliquæ.

E. costata. *Andr. Er. n. 46. cum Ic.*

Multas alias varietates nunc describere supercedeo.

*Decora*, E. calyce plano marginibus crassis : corollâ 8—10-lineari, viscido-pubescente ; tubo clavato : calcaribus longis, pubescentibus.

E. Eweri. *Hortulanis*.

Flores pulcherrime roseo-virides.

*Cupressifor-*  
*mis*, E. calyce adpresso : corollâ 9—11-lineari, glutine illitâ ; tubo tenuissime striato : calcaribus brevibus, glabris.

E. discolor. *Andr. Er. n. 3. cum Ic. malâ.*

Dignoscas ab omnibus varietatibus *Vericoloris*, filamentis angustioribus, et calcaratis.

*Melliflua*. E. bracteâ infimâ juxta basin pedunculi : corollâ 9—12-lineari, lucidâ ; tubo clavato, plus minus compresso : pericarpio ovato.

Variat:

Variat  $\alpha$ : Calyx yalte ferratus. Corolla cruenta.

E. cruenta. *Pl. Kew. t. 13.* optima.

$\beta$ : Calyx parum ferratus. Corolla punicea.

E. cruenta. *Andr. Er. n. 17. cum Ic.* E. cruenta. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2.*  
*p. 16.*

Posterior varietas est longe pulchrior, et robustior.

E. caule humifuso: foliis obtusis: corollâ 9—11-lineari, extus rorulentâ; tubo clavato, compresso: calcaribus longis.

E. depressa. *Hortulanis.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, locis rupestribus, legit F. Masson.

Floret Octobri, Novembri.

Persingularis est hæc Erica, flores grandes luteos cauli humillimo jungens.

E. foliis densissimis: calyce longe cuspidato: corollâ 6—8-lineari, glabrâ; tubo cylindraceo: calcaribus longis. *Spiffifolia,*

E. Pattersonia. *Wendl. Er. fasc. 1. p. 15. cum Ic.* E. Pattersonia. *Andr. Er. n. 7. cum. Ic. bonâ.* E. abietina. *Linn. Diff. n. 20. cum fig. floris.* E. abietina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 506.*

Sponte nascentem juxta *Cap Fals*, legit G. Paterson.

E. calyce late ovato, acuminulato: corollâ 6—8-lineari, glabrâ; tubo cylindraceo: calcaribus longis: antheris linearibus, valde papulosis. *Sacciflora,*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

- Cylindriflora.* E. foliis ciliatis fetis decompositis : calyce recurvulo : corollâ 9-lineari, glabrá : tubo cylindraceo : calcari- bus brevibus.  
 E. serratifolia. *Andr. Er. n. 36. cum Ic.*  
 Filamenta in nostris exemplaribus nunquam mutica.

- Paludosa,* E. corollâ 7—9-lineari, pubescente, tubo parum clavato : antheris basi rostratis : pericarpio apice cotyli- gerō.  
 E. abietina. *Andr. Er. n. 64. cum Ic.* E. concinna. *Schneev. Ic. n. 31.* E. concinna. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 23.* E. verticillata. *Berg. Pl. Cap. p. 99.* E. africana erecta, paludosa, &c. *Herm. Cat. Pl. Afr.*  
 Nomen antiquum, et hortulano utilissimum, restituī.

- Lituiflora :* E. calyce obovato : corollâ 6—8-lineari, pubescente ; tubo valde clavato : filamentis dorso apicis barbatis.  
 E. perspicua. *Wendl. Er. fasc. 1. p. 7. cum Ic.* E. Lin- næi ! *Hortulanis.*  
 Pericarpium in hac, et antecedente, 6—8.loculare.

- Obpyramida- lis,* E. corollâ  $3\frac{1}{2}$ —4-lineari, pubescente ; tubo infundi- buliformi ; limbi interstitiis extrorsum tumidis : peri- carpio sphærico.  
 E. pyramidalis. *Curt. Bot. Mag. n. 366. cum Ic.* E. py- ramidalis. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 401.*  
 Sponte nascentem juxta Zwart Rivier, locis humidis, legit F. Masson.  
 Ad stirpem vix naturalem, suum nomen proposuit So- lander,

lander, rami enim debiles, et penduli sunt: itaque a tubo corollæ *Obpyramidalē* dixi.

E. caule tenui: corollâ  $2\frac{1}{2}$ —3-lineari, pubescente: tubo *Cyrillaflora*; anguste campanulato; limbo brevi: filamentis multicis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, locis humidis, legit I. Mulder.

Flores pallide coccinei.

E. corollâ  $2\frac{1}{2}$ —3-lineari, pubescente; tubo obovato; *Velitaris*. limbo recurvo-patente: calcaribus longis, argute cuneatis, parum ferratis.

E. glabra. *Roxb. MS.*

Nomen nostrum a foliis perangustis, *Velitum jacula* referentibus, petitum.

E. calyce ovato-cuneato: corollâ 7—8-lineari, pubescente; tubo cylindraceo-urceolari; limbo revoluto; pericarpio obpyramidalī.

E. spuria. *And. Er. n. 46. cum Ic.*

Facies *Tubifloræ*, cui certo proxima, sed nequaquam varietas. Filamenta evidenter calcarata, quæ mutica ostendit figura citata.

E. pedunculis glabris: calyce anguste lyrato: corollâ *Tubiflora*, 9—10-lineari, pubescente: limbi interstitiis basi lanceolatis.

Variat α: Corolla pallide carnea.

*E. tubiflora.*

E. tubiflora. *Linn. Diff.* n. 40. *cum fig. floris.*

E. tubiflora. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 505.*

$\beta$ : Corolla lâte carnea.

E. coccinea. *Linn. Diff.* n. 42. *cum fig. floris.*

E. foliis, &c. *Linn. Hort. Cliff.* p. 148. n. 10.

Antheræ in postremâ varietate longius foraminosæ.

*Curviflora*, E. pedunculis pubescentibus: calyce ovato-cuneato: corollâ 9-linearî, pubescente; limbi interstitiis basi lanceolatis.

E. simpliciflora. *Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 402.* E. curviflora. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 305.* auctoritate ipsius speciminis.

Haud facile est hanc in herbariis a *Tubiflorâ* semper dignoscere, et si facies viva multum abludat: foliorum laminæ autem in hac constanter linearî-attenuatæ, in illâ linearî-lanceolatæ: flores insuper rufi.

*Cuspidigera*, E. pedunculis glabris: calyce ovato-cuspidato: corollâ 11—12-linearî, pubescente; limbi interstitiis basi lanceolatis: antheris hirtis.

Sponte nascentem juxta *Berg Rivier*, legit I. Mulder.  
Filamenta rare villosa.

*Bibax*, E. calycis foliolis imbricatis, inæqualibus: corollâ 8-linearî, pubescente; tubo valde clavato; laciniis basi imbricatis.

E. curviflora. *Thunb. Diff.* n. 30. E. Flammea. *Hortulanis.*

Sponte nascentem juxta *Palmit Rivier*, legit F. Masson.  
E. pedunculis

E. pedunculis pubescentibus: corollâ 9—10-lineari, pubescente; limbo recurvo-patente: filamentis pubescentibus. *Buccinæformis*,

E. tubiflora. *Thunb.* *Diff. n.* 31.

E. pedunculis glabris: corollâ 10—11-lineari, glabrâ; limbo recurvo-patentissimo: pericarpio late turbinate.

E. curviflora. *Wendl.* *Er. fasc. 34.* p. 7. cum *Ic.* E. curviflora. *Andr.* *Er. n. 40.* cum *Ic.* E. curviflora. *Linn.* *Diff. n. 41.* cum *fig. floris*, *pessimâ*.

Species in solo natali forsan procula, nam culta in quatuor annis jam quindecimpedalis est.

E. foliorum laminis hirsutis: pedunculis glabris: corollâ 10—11-lineari, hirsutâ: antheris rectis, papulosis.

E. tubiflora. *Roxb.* *MS.*

Herba tota hirsuta est: cæterum facies sequentis, floribus pariter flavis.

E. pedunculis pubescentibus: calyce incurvo-erecto basi extus concavâ: corollâ 15-lineari, pubescente; limbo retuso. *Conspicua*,

E. conspicua. *Pl. Kew.* t. 12. optima. E. conspicua. *Andr.* *Er. n. 29.* cum *Ic.* E. conspicua. *Soland.* in *Ait. Hort. Kew.* v. 2. p. 22.

Sponte nascentem prope *Stellenbosch*, legit F. Masson.

E. pedunculis glabris: calyce recurvo-patente basi extus convexâ: *Longiflora*,

convexâ: corollâ 18—20-lineari, pubescente; limbo obtuso.

E. elata. *Hortulanis*.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

Herba, si probe observas, exquisite pulverulenta.

*Verticillaris*, E. ramis verticillatis, lanatis: calyce incurvo-patente basi extus concavâ: corollâ 9—11-lineari, rare lanatâ.

E. lanata. *Wendl. Obs.* p. 45?

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

Flores saturate rufo-fulvi.

*Floccosa*. E. ramis sparsis, lanatis: floribus saepius 1-riis: calyce adpresso basi extus convexâ: corollâ 12-lineari, rare lanatâ.

E. sordida. *Andr. Er.* n. 56. cum *Ic.* quæ revera titulo respondet. E. laniflora. *Wendl. Er. fasc.* 2. p. 23. cum *Ic.*

Affinis præ cæteris antecedenti: sed differt omnino Habitum, Tempore florendi, Foliorum laminis recurvis reclinatisve, Floribus saepius tantum solitariis, Corollis latioribus limbo magis revoluto, Antherarum valvis basi sursum oblique emarginatis.

*Radiflora*, E. petiolis angustissimis: corollâ 13-lineari, viscidâ; tubo cylindraceo-urceolari apice ventricoso: calcariis subulatis.

E. octophylla. *Willd. Sp. Pl.* v. 2. p. 372. E. fascicularis. *Willd. Sp. Pl.* v. 2. p. 372. E. fascicularis. *Pl. Kew.*

*Pl. Kew. t. 6.* E. coronata. *Andr. Er. n. 10. cum Ic.*  
*bonâ. E. octophylla. Thunb. Diff. n. 72. cum Ic.*  
*E. fascicularis. Linn. Suppl. p. 219.*

Sponte nascentem juxta *Hottentots Holland Kloof*, legit  
 F. Masson.

E. foliis hirsutis : corollâ 10—11-linearî, viscidâ ; tubo cylindraceo-urceolari apice ventricoso : pericarpio stipitato. *Lycopodiifolia.*

E. Massoni. *Pl. Kew. t. 18.* cæteris longe antecellente.  
 E. Massoni. *Curt. Bot. Mag. n. 356. cum Ic.* E. Massonia. *Andr. Er. n. 9. cum Ic.* E. Massoni. *Linn. Suppl. p. 219.*

E. foliorum laminis recurvîs, acutis : corollâ 13—15-linearî, viscidâ ; tubo infundibuliformi ; laciniis ova-to-cuneatis. *Pharetræ-formis,*

Variat  $\alpha$  : Corolla aurantiaca.

E. exsurgens. *Andr. Er. n. 13. cum Ic.*  
 $\beta$  : Corolla rutila.  
 E. abietina. *Roxb. MS.*

Dignoscas ab omnibus mihi visis, corollæ laciniis versus apicem attenuatis bifidulisque.

E. foliorum laminis reclinatis, obtusiusculis : corollâ 12—14-linearî, viscidâ ; tubo clavato : filamentis exsertis. *Grandiflora;*

E. grandiflora. *Pl. Kew. t. 8.* E. grandiflora. *Curt. Bot. Mag. n. 189. cum Ic.* E. grandiflora. *Thunb.*

*Diff. n.* 28! auctoritate ejus speciminis. *E. grandiflora*. *Linn. Suppl.* p. 223.

Sponte nascentem juxta *Breede Rivier*, solo arcuoso, legit F. Masson.

*Cerviciflora*; *E. corollâ 5—6-lineari*, pubescentulâ; tubo anguste urceolari; limbo patente: filamentis minute calcaratis.

*E. inaperta*. *Hortulanis*.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder. Hæc species primâ vice adhuc parcus floruit, nec ejus inflorescentiam omnino intelligo, an revera hujus cohortis: bracteæ autem certo tres in singulis pedunculis.

*Pinifolia*, *E. calycis foliolis imbricatis*, longe cuspidatis: corollâ 6—7-lineari, glabrâ; tubo clavato: filamentis calcaratis: pericarpio lævi.

*E. pinea*. *Thunb. Diff. n.* 26.

Sponte nascentem prope *Baay Fals*, legit G. Robertson.

*Calamiformis*, *E. calyce adpresso*: corollâ 9—10-lineari, glabrâ; tubo cylindraceo-urceolari; limbo recurvo: pericarpio lævi.

*E. radiata*. *Andr. Er. n. 53. cum Ic.*

Bracteæ infra medium pedunculi.

*Longifolia*, *E. petiolis angustissimis*: corollâ 9—11-lineari, pubescente; tubo plus minus clavato: filamentis sæpius muticis: pericarpio superne sericeo.

Variat

Variant  $\alpha$ : Corolla alba.

*E. vestita alba. Andr. Er. n. 20. cum Ic.* *E. vestita. Thunb. Diff. n. 25.*

$\beta$ : Caulis coarctatus. Corolla alba.

*E. pinifolia. Hortulanis.*

$\gamma$ : Caulis coarctatus. Corolla rubra.

*E. pinifolia. Roxb. MS.*

$\delta$ : Caulis valde crassus. Corolla pallidissime carnea.

*E. longifolia. Pl. Kew. t. 4. optima.*

$\epsilon$ : Corolla purpurea.

*E. vestita purpurea. Andr. Er. n. 8. cum Ic.*

$\zeta$ : Corolla coccinea.

*E. vestita coccinea. Andr. Er. n. 33. cum Ic.*

*E. vestita coccinea. Curt. Bot. Mag. n. 402.  
cum Ic.*

$\eta$ : Caulis crassus. Corolla carnea.

*E. pinea. Andr. Er. n. 57. cum Ic.*

In foliis omnium est etiam quædam differentia.

*E. calyce adpresso*: corollâ 5—6-lineari, viscidâ; tubo *Coflæflora*, clavato, costato: antheris juxta apicem foraminosis.

*E. Leea. Andr. Er. n. 20. cum Ic.* bonâ.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

*E. calyce apice recurvulo*: corollâ 9—10-lineari, viscidâ; tubo clavato, costato: antheris a medio foraminosis. *Onosmæ-flora*,

*E glutinosa. Andr. Er. n. 31. cum Ic.* bonâ.

Flores sulphurei.

*Pulvini-formis*, E. foliorum laminis attenuatis, ferrulato-ciliatis : floribus in rudimentis ramorum longiusculis : corollâ 7—9-linearî, viscidâ ; tubo cylindraceo-urceolari.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder. Faciem *Crinifoliæ* mire simulat, sed distinctissima est et inflorescentiâ, et filamentis, quæ prorsus mutica, atque instar sequentis pubescentia.

*Frondosa*, E. caule angulato : foliorum laminis attenuatis : calyce patulo : corollâ 9—10-linearî, viscidâ ; tubo vix clavato.

E. coccinea. *Wendl. Er. fasc. 3. p. 9. cum Ic.* E. coccinea. *Andr. Er. n. 41. cum Ic.* E. coccinea. *Thunb. Diff. n. 27.* E. coccinea. *Berg. Pl. Cap. p. 93.* E. abietina. *Linn. Sp. Pl. ed. 1. p. 355.* E. foliis subulatis, &c. *Linn. Hort. Cliff. p. 148. n. 9.* auctoritate ipsius speciminis.

Sponte nascentem juxta *Baay Fals*, legit G. Paterson.

*Phylloefolia*, E. caule tereti : foliorum laminis brevibus, parum attenuatis : calyce incurvo-erecto : corollâ 8—9-linearî, viscidâ ; tubo vix clavato.

E. purpurea. *Andr. Er. n. 4. cum Ic.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder. Diu hærebam animi dubius, an tantum pro varietate antecedentis proponerem : ob herbæ multas differentias, et calycem, tandem separavi.

*Argutifolia*. E. foliorum laminis valde attenuatis, argute reduplicatis :

tis : corollâ 5—6-linearî, viscidâ ; tubo infundibuli-formi.

E. pulchella. *Thunb. Diff. n. 24. cum Ic.*

Nescio quæ facies torva et scabra hanc ab affinibus primo intuitu distinguit.

E. pedunculis brevissimis : calyce calloso : foliolis rhombo-spatulatis, integerimis : corollâ 5—9-linearî, rorulentâ. *Favosa,*

Variat  $\alpha$  : Corolla 7—9-linearis ; laciniis basi contiguis.

E. spicata. *Wendl. Er. fasc. 2. p. 27. E. spicata. Thunb. Diff. n. 71. cum Ic. E. sessili-flora. Linn. Suppl. p. 222.*

$\beta$  : Corolla 5—7-linearis ; laciniis basi imbricatis..

E. spicata. *Andr. Er. n. 6. cum Ic.*

Inflorescentia e collatione affinium specierum tantummodo intelligenda, rudimentis ramulorum pedunculos simulantibus, veris pedunculis sene omnium brevissimis, aut nullis.

E. caule stricto : pedunculis brevissimis : calyce calloso, foliolis late spatulatis, inciso-ferratis : corollâ 7—10-linearî, rorulentâ. *Sceptri-formis,*

E. enneaphylla. *Roxb. MS.*

Foliorum numerus ultra 4-narium, in toto genere valde inconstans est.

E. pedunculis brevissimis : calycis foliolis orbiculato-spatulatis, *Claviflora,*

spatulatis, integerimis: corollâ 10—12-linearî, rorulentâ.

Communicavit *Hibbert*.

Herba ad amissim sequentis.

*Alveiflora*, E. pedunculis glabris: corollâ 7—9-linearî, rorulentâ; tubo cylindraceo-urceolari, inferne 4-angulo.

E. gelida. *Hortulanis*.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, solo humido, legit F. Masson.

*Mammosa*. E. pedunculis pubescentibus: corollâ 8—10-linearî, rorulentâ; tubo cylindraceo-urceolari, juxta basin 4-fosso.

Variat  $\alpha$ : Corolla coccinea.

E. verticillata. *Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 370.*

E. verticillata. *Andr. Er. n. 21. cum Ic.*

E. speciosa. *Schneev. Pl. n. 3. cum Ic.*

$\beta$ : Corolla lâte purpurea.

E. mammosa. *Andr. Er. n. 58. cum Ic.*

E. abietina. *Schneev. Pl. n. 23. cum Ic.* E. abietina. *Thunb. Diff. n. 68. auctoritate ejus speciminis.* E. mammosa. *Linn. Mant. p. 234.* E. mammosa. *Linn. Diff. n. 21. cum fig. floris.* E. abietina. *Berg. Pl. Cap. p. 105. auctoritate ejus speciminis.* E. folio Juniperi, &c. *Buxb. Gent. 4. p. 25. t. 41. 42.* E. african. arborescens, &c.

*Barth. Act. v. 2. p. 57. cum Ic.*

$\gamma$ : Corolla sordide purpurea.

E. abietina. *Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 369.*

Hæ tres, et aliæ varietates, omnes Iudunt stigmatibus  
interdum exsertis.

E. corollâ 6—8-lineari, utrinque hirsutâ; tubo curvo, *Brachialis*.  
pyramidalis: antheris inclusis, longissimis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.  
Herba Sexfariæ.

E. foliorum laminis lineari-attenuatis, setis aspersis: ca-  
lyce cuneato: corollâ 4—6-lineari, extus totâ setosâ. *Hystrici-*  
*flora,*

E. Spaarmanni. *Thunb. Diff. n. 33.* E. Spaarmanni.  
*Linn. Suppl. p. 219.* E. Spaarmanni. *Linn. in Act.*  
*Holm. 1778. p. 24 t. 2.*

Sponte nascentem juxta *Kromme Rivier*, legit A. Spaar-  
man.

E. foliorum laminis ovato-cuneatis, breviter pectinatis: *Strigilifolia*,  
calyce cuneato: corollâ 6—7-lineari, extus versus  
apicem setosâ.

E. transparens. *Thunb. Prodr. p. 71.* E. cerinthoides γ.  
*Thunb. Diff. n. 33.*

Filamenta in hac calcarata.

E. foliorum laminis anguste ovato-cuneatis, pectinatis: *Pectini-*  
calyce rhombo-spatulato: corollâ 5—7-lineari, intus *folia*,  
lanatâ.

E. cerinthoides β. *Thunb. Diff. n. 33.*

Sponte nascentem in *Lange Kloof*, legit F. Masson.

E. foliorum laminis lineari-lanceolatis, pilosis: calyce *Crinifolia*.  
cuneato: corollâ 8—10-lineari, extus viscidio-pilosâ.

E. cerinthoides. *Andr. Er. n. 25.* cum Ic. E. cerin-  
thoides.

thoides. *Curt. Bot. Mag.* n. 220. *cum Ic.* E. cerinthoides  $\alpha$ . *Thunb. Diff.* n. 33. E. cerinthoides. *Berg. Pl. Cap.* p. 104. E. cerinthoides. *Linn. Diff.* n. 43. *cum fig. floris.* E. cerinthoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2.* p. 505. E. coris folio, &c. *Breyn. Cent.* p. 25. t. 13. E. africana umbellata, &c. *Barth. Act. v. 2.* p. 57.  
Ludit interdum una eademque stirps, corollis multo brevioribus, erectis, stigmate longe exerto. Filamenta constanter calcarata sunt, nec mutica.

- Cernua.* E. bracteis decurrentibus : calyce valde fimbriato : corollâ  $2\frac{1}{2}$ -lineari ; tubo globoso : calcaribus auricularibus.  
E. cernua. *Linn. Suppl.* p. 222. E. cernua. *Montin in Nov. Act. Ups. v. 2.* p. 291. t. 9. f. 3.  
Sponte nascentem in *Koude Bockveldt*, legit F. Masson.

- Doliiformis.* E. foliis hirsutis : bracteis juxta calycem : corollâ 4—5-lineari, viscidâ ; tubo urceolari : calcaribus brevibus, cuneatis.  
E. mammosa. *Thunb. Diff.* n. 69. *cum fig.* in ed. nostrâ. Nulla mihi cognitæ affinis, nisi forte *Pallidæ*.

- Pistillaris.* E. pedunculis foliolis gemmaceis obsitis : corollâ 3-lineari, lævi ; tubo curvulo, iufundibuliformi ; limbo recurvo.  
E. australis. *Linn. Mant.* p. 231. E. coris folio 11. *Clus. Hist. Pl. lib. 1.* p. 42.  
Semina ad hilum, appendiculam fungosam exserunt.

- Ciliaris.* E. foliorum laminis ovatis ; corollâ 4-lineari, lævi ; tubo ovato-pyramidalis latere superiore ventricosiore.  
E. ciliaris.

*E. ciliaris.* *Curt. Bot. Mag.* n. 484. *cum Ic. bona.* *E. ciliaris.* *Linn. Diff.* n. 39. *cum fig. floris.* *E. ciliaris.* *Linn. Sp. Pl. ed. 1.* p. 354. *E. ciliaris.* *Loefl. Ref.* p. 138. *E. xii. Cluf. Hist. Pl. lib. 1.* p. 46.  
Folia terna sunt, at juxta sequentem in serie naturali,  
ni fallor, locanda est, ob corollæ similitudinem.

*E. foliorum laminis ciliatis:* calyce adpresso: corollâ 3-lineari, apice extus pubescente: calcaribus lanceo-latis. *Botuliformis,*

*E. Tetralix.* *Curt. Fl. Lond. fasc.* 1. t. 21. bona. *E. Tetralix.* *Linn. Sp. Pl. ed. 2.* p. 507.

*E. foliorum laminis subtus bisulcis:* calyce patente: *Multicaulis.* corollâ  $2\frac{1}{2}$ -lineari, lœvi: calcaribus auricularibus.

*E. stricta.* *Willd. Sp. Pl. v. 2.* p. 366.

Sponte nascentem in Ins. *Corsica*, legit G. Jones.

Caules undique diffusi, nequaquam stricti.

*E. floribus caule nudo verticillatis:* corollâ 3-lineari; *Mutabilis.* tubo urceolari: calcaribus auricularibus.

*E. cinerea.* *Curt. Fl. Lond. fasc.* 1. t. 25. bona. *E. cinerea.* *Linn. Sp. Pl. ed. 2.* p. 501. *E. cinerea.* *Loefl. Ref.* p. 137.

Flores purpurei, mox cum primum marcescunt cœrulei, ut descripsit Loefling.

*E. caule glabro:* foliorum laminis recurvis, attenuatis: *Uncifolia.* corollâ  $1\frac{3}{4}$ -lineari, obovatâ: calcaribus longissimis.

*E. regerminans.* *Linn. Mant.* p. 322.

Flores in rudimentis ramulorum axillaribus, nec racemosi: ad exemplar Linnæanum characterem concinnavi, nec in ullo alio herbario adhuc vidi.

*Caduceifera*. E. foliorum laminis cuneatis ovatisve: corollâ  $\frac{2}{3}$ -linearie: filamentis juxta medium calcaratis.

E. pulchella. *Andr. Er.* n. 51. *cum Ic.* mediocri. E. articulatis. *Thunb. Diff.* n. 58. E. pulchella. *Houtt. Nat. Hist. v. 4. p. 504. t. 23. f. 1.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson. Hæc species, primum, veram insertionem calcarium *Ericarum* mihi docuit, cujus stamina Mercurii fabulosum caduceum lepide simulant: nempe in omnibus non ab antheris sed e filamentis ortum suum ducunt.

*Empetrifolia*, E. calyce tetraphyllo: corollâ 2-linearie, hirsutâ; tubo urceolari; limbo recurvo-patente: stigmate longe exerto.

E. empetrifolia. *Thunb. Diff.* n. 70. E. empetrifolia. *Linn. Mant. p. 374.* E. empetrifolia. *Linn. Diff. n. 15. cum fig. floris,* pessimâ.

Sponte nascentem juxta *Baay Fals*, legit F. Masson.

*Molleolaris*, E. calyce quadrifido: corollâ  $1\frac{2}{3}$ -linearie, lævi; tubo urceolari; limbo recurvo-patentissimo: pericarpio hirsuto.

E. empetrifolia. *Schneev. Pl. n. 17. cum Ic.* E. empetrifolia. *Houtt. Nat. Hist. v. 4. p. 517. t. 23. f. 2.* E. empetrifolia. *Berg. Pl. Cap. p. 120.* auctoritate ejus speciminis.

Herba antecedentis, sed flores diversissimi.

E. calyce

E. calyce quadrifido: corollâ 2-lineari, lævi; tubo ob-  
ovato; limbo incurvo-patente: pericarpio hemisphæ-  
rico, glabro. *Pyxidiflora*,

E. empetroides. *Hortulanis*.

Flores odorem ceræ Apum spirant.

E. calyce tetraphyllo: corollâ 2-lineari, lævi; tubo *Nolæflora*.  
calathiformi; limbo recurvo-patente: stigmate in-  
cluso.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.  
Pedunculi multo longiores quam affinium, floribus in  
meâ stirpe cultâ ultra folia extantibus.

E. caule valde angulato: foliis 4-nis: corollâ 2½-lineari,  
viscidâ; tubo anguste urceolari: filamentis muticis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.  
Flores fulvi: in cæteris hujuscce cohortis mihi visis folia  
semper 5—6-na.

E. corollâ 2-lineari, viscidâ; tubo urceolari, parum cos-  
tato: filamentis longitudine tubi, calcaratis: peri-  
carpio viscido. *Fallax*,

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.  
Antheræ 2-partitæ, vix tamen revera didymæ.

E. corollâ 3-lineari, viscidâ; tubo urceolari, parum costa-  
to: filamentis vix longitudine tubi, minute calcaratis. *Parilis*,

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.  
Habitus prioris, sed præter calycis foliola basi angusti-  
ora, Antheræ duplo majores sunt, et calcaria fila-  
menti apicem pene tota decurrent.

- Viscida.* E. corollâ 3-lineari, viscidâ; tubo cyathiformi, costato: filamentis brevissimis: pericarpio sericeo.  
 Variat  $\alpha$ : Folia incana,  $1\frac{1}{2}$ —3 lineas longa.  
 E. viscaria. *Thunb. Diff. n. 40.* E. viscaria.  
*Linn. Mant. p. 231.* E. viscaria. *Linn. Diff. n. 46. cum fig. floris,* pessimâ.  
 $\beta$ : Folia viridia, 3—5 lineas longa.  
 E. viscaria. *Andr. Er. n. 55. cum Ic.* E. viscaria. *Pl. Kew. t. 1.* optima, partibus dis-  
 sectis exceptis.  
 Facie admodum discrepant hæ varietates.

- Catervæflora.* E. caule angulato: corollâ 2-lineari, pubescente; tubo anguste obovato: antheris longe foraminosis.  
 E. pubescens 3. villosa. *Thunb. Diff. n. 61.*  
 Sponte nascentem in summitate *Taffelberg*, legit C. P. Thunberg.  
 Species legitima proculdubio, gravis enim est differentia caulis antherarumque.

- Pubigera,* E. calyce patente, ovato-acuminato: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari, pubescente; limbo longiusculo, recurvo: pericarpio hirto.  
 Communicavit *Hibbert.*  
 Facile dignoscas limbo corollæ longiusculo, recurvo, et penitus obtuso.

- Mitraformis,* E. foliorum laminis parum reduplicatis, fimbriatis: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari, pubescente; limbo erecto: pericarpio glabro.  
 E. pubescens.

E. pubescens. *Andr.* *Er.* n. 60. *cum Ic.* E. hirtiflora.  
*Curt. in Bot. Mag.* n. 481. *cum Ic. optimâ.* E. pubescens 2 : hispida. *Thunb.* *Diff.* n. 61.  
 Folia aliquando sparsula, cæterum, ut in ipso specimine  
 Thunbergiano, quaterna.

E. calyce adpresso, anguste ovato-cuneato : corollâ  $1\frac{1}{3}$ -lineari, pubescente ; limbo brevissimo, recurvo : pericarpio hirto. *Tardiflora*,

E. pubescens. *Curt. in Bot. Mag.* n. 480. *cum Ic. optimâ.*  
 Sponte nascentem juxta *Taffelberg*, legit F. Masson.

Hanc ab antecedente probe distinxit *Curtis* : differt enim caule graciliore ; ramis floriferis multo brevioribus ; foliorum laminis magis incurvis, lateribus valde reduplicatis, integerrimis ; corollæ laciniis recurvis, latius imbricatis ; calcaribus angustioribus ; antheris glabris, foraminibus brevioribus ; denique seminibus scrobiculatis.

E. calyce adpresso, rhombeo-cuneato : corollâ  $1\frac{1}{3}$ -lineari, pubescente ; calcaribus auricularibus : pericarpio glabro. *Parviflora*,

E. pubescens. *Linn. Diff.* n. 19. *cum fig. floris.* E. pubescens. *Berg. Pl. Cap.* p. 121. E. parviflora. *Linn. Sp. Pl. ed. 2.* p. 506.

Folia quaterna, laminis valde reduplicatis.

E. calyce adpresso, ovato-acuminato : corollâ 1-lineari, pubescente ; tubo ovali ; limbo brevissimo : calcaribus linearis-attenuatis : pericarpio glabro. *Exigua*.

*E. pubescens* 4: *parviflora*. *Thunb.* *Diff. n.* 61.  
Folia interdum terna, saepius quaterna.

*Pufilla.*

*E. calyce adpresso*, late ovato-cuneato: corollâ  $\frac{1}{4}$ -lineari, pubescente; tubo calathiformi; limbo longitudo tubi: pericarpio glabro.  
Sponte nascentem prope *Baay Fals*, legit I. Mulder.  
Non solum parvitate, sed etiam proportione omnium partium floris, a cæteris hujus cohortis abludit.

*Tragulifera*; *E. calyce imbricato*: corollâ  $2\frac{1}{3}$ -linearis; tubo urceolari; limbo recurvo: calcaribus hirsutis: antheris latissime foraminosis, hirsutis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

*Guttaflora,*

*E. foliorum* laminis linearis-attenuatis: corollâ  $1-2\frac{1}{2}$ -linearis; laciniis apice guttâ illitis: calcaribus pubescentibus.

Variat  $\alpha$ : Caulis fastigiatus. Corolla  $1-1\frac{1}{2}$ -linearis, tubo hemisphærico. Stigma longe-exsertum.

*E. lateralis*. *Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 380.*

$\beta$ : Caulis demissus. Corolla 2-linearis, tubo late ovato. Stigma breviter exsertum.

*E. incarnata*. *Andr. Er. n. 27. cum Ic.*

$\gamma$ : Caulis demissus. Corolla  $2\frac{1}{2}$ -linearis, tubo ovato. Stigma breviter exsertum.

*E. rubens humilis*. *Wendl. Er. fasc. 3. p. 13. cum Ic.*

Flores non vere axillares, sed rudimentis ramulorum.

E. foliorum laminis linearibus: calyce adpresso: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari; tubo sphærico: calcaribus pubescentibus: stylo sursum curvo. *Curvirostris*,

E. declinata. *Hortulanis*.

*Frutex humilis*, vix pro varietate prioris habendus, *Anthoris* nimium diversis. Flores gravem, et plane nauseosum odorem spargunt.

E. pedunculis glabris: calyce incurvo-patente: corollâ  $1\frac{3}{4}$ -lineari; tubo sphærico: calcaribus auricularibus, glabris. *Obeja*,

E. margaritacea. *Andr. Er. n. 54. cum Ic. malâ*. E. margaritacea. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 20.*

Sponte nascentem juxta *Stellenbosch*, legit F. Masson.

E. calyce minuto: corollâ  $1\frac{1}{3}$ -lineari; tubo ovali; *Gracilis*, limbo recurvo: calcaribus linearis-attenuatis, hirtis.

E. imbecilla. *Hortulanis*.

Caulis quamvis gracilis recte attollitur, minime imbecillis.

E. caule tenui: foliis verticillis remotis: corollâ  $1\frac{1}{2}$ —2-*Intervallaris*, lineari; tubo ovato-cylindraceo, ore lato: pericarpio hirto.

E. elongata. *Roxb. MS.*

Species pulcherrima, ramulo fere omni floribus parvis, rubris, oblongis, nutantibus onusto.

E. caule glabro: corollâ  $1\frac{1}{4}$ -lineari; tubo poculiformi; *Quadraeflora*, limbo erecto: calcaribus lanceolato-euneatis, integerimis.

E. quadrangularis. *Prodr. p. 297.*

Sponte

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.  
Flores inconspicui, sed in vasto genere distinctissimi.

*Prolifera*, E. caule hirsuto: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari; tubo cyathiformi;  
limbi interstitiis acutis: calcaribus rectis: pericarpio  
hирто.

E. caffra. *Andr. Er. n. 50. cum Ic.* E. strigosa. *Wendl. Er. fasc. 2. p. 25. cum Ic.* E. strigosa. *Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 365.* synonymo et descriptione exclusis.  
E. persoluta 2. *Thunb. Diff. n. 62.* E. persoluta.  
*Linn. Mant. p. 230.* E. persoluta. *Linn. Diff. n. 16.*  
*cum fig. floris.* E. subdivaricata. *Berg. Pl. Cap. p. 114.*

Florescentiâ peractâ, rami plerumque e centro florum  
ultra producuntur.

*Cyathiformis*, E. pedunculis glabris: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari; tubo cyathiformi;  
limbi interstitiis acutis: calcaribus falcatis.

E. lеvis. *Hortulanis.*

Valde affinis sequenti, antheris pene ad amissim re-  
spondentibus: ob limbi interstitia tamen ægre varieta-  
tem esse concedam.

*Pelviformis.* E. pedunculis rare pubescentibus: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari;  
tubo pelviformi; limbi interstitiis basi ovalibus: cal-  
caribus falcatis.

E. persoluta. *Cart. in Bot. Mag. n. 342.* E. persoluta 1.  
*Thunb. Diff. n. 62.* E. viridi-purpurea. *Linn. Diff. n. 9. cum fig. floris.* auctoritate ipsius speciminis.  
E. mauritanica. *Linn. Syst. Nat. ed. 10. p. 1002.*

Variat floribus albis, purpureis.

E. foliis

*E. foliis angustis: calyce recurvo-horizontali: corollâ 2-lineari; tubo hemisphærico; laciniis basi imbricatis.*

*E. cupressina. Hortulanis.*

Foliorum laminæ pene enerves videntur.

*E. foliis latis: calyce reclinato-deflexo: corollâ 2½-lineari; tubo late ovato: limbi interstitiis basi ovatis.* *Lacunæflora,*

*E. Bergiana. Wendl. Er. fasc. 2. p. 29. cum Ic. E. quadriflora. Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 379. E. Bergiana. Schneev. Pl. n. 46. cum Ic. E. Bergiana. Linn. Mant. p. 235. E. Bergiana. Linn. Diff. n. 6. cum fig. floris, pessimâ.*

Foliorum Laminæ evidenter 1-nerviæ.

*E. bracteis minutissimis: calyce incurvo-deflexo: corollâ 2-lineari; tubo globoſo; laciniis basi imbricatis.* *Florida.*

*E. florida. Thunb. Diff. n. 64.*

In hac Calcaria lanceolata.

*E. caule glabro: corollâ 1½-lineari, lævi; tubo turbinato, 8-angulo; limbo incurvo: calcaribus auricularibus, glabris.* *Turbiniflora,*

Communicavit *Hibbert.*

Flores pallide purpurei.

*E. caule viscidulo: corollâ 1½-lineari; tubo sphærico, valde 8-angulo: limbo recurvo-erecto: pericarpio hirto.* *Bullularis,*

VOL. VI.

3C

*E. granulata.*

E. granulata. *Linn.* *Mant.* p. 234. E. ramentacea.  
*Linn.* *Mant.* p. 65. E. multumbellifera. *Berg.* *Pl.*  
*Cap.* p. 110. E. pilulifera. *Berg.* *Pl.* *Cap.* p. 111.

*Mucosa*, E. caule glabro: corollâ 2-lineari, viscidâ; tubo plus minus obovato; limbi interstitiis parum tumidis.  
E. mucosa. *Pl.* *Kew.* t. 15. bona. E. mucosa. *Linn.* *Mant.* p. 232. E. ferrea. *Berg.* *Pl.* *Cap.* p. 112.  
Folia mire ludunt; laminis linearibus, linear-i-lanceolatis, vel etiam ovalibus.

*Piluliformis*, E. foliis sparsis: corollâ  $2\frac{1}{2}$ -lineari, lævi; tubo longitudo calycis: calcaribus linear-i-attenuatis: pericarpio lævi.  
E. nudicaulis. *Berg.* *Pl.* *Cap.* p. 113. E. pilulifera.  
*Linn.* *Sp.* *Pl.* ed. 2. p. 507.  
Foliorum Laminæ reduplicaturâ minute ciliatæ.

*Obliqua*, E. foliis oblique verticillatis: spicis coarctatis: corollâ  $3\frac{1}{2}$ -lineari, viscidâ; limbi interstitiis in uncum tumidis.  
E. obliqua. *Pl.* *Kew.* t. 3. optima. E. obliqua. *Thunb.*  
*Diff.* n. 73. cum *Ic.* bonâ.  
Flores pallide purpurei.

*Sequax*, E. foliis teneris glutine arachnoideis: fasciculis 4—6-floris: corollâ 3—4-lineari, viscidâ; limbi interstitiis in uncum tumidis.  
Variat α: Corolla 3-linearis; tubo late ovato.  
E. physodes. *Thunb.* *Diff.* n. 89. E. physodes.

fodes. *Linn. Diff.* n. 32. *cum fig.* E. physodes. *Berg. Pl. Cap.* p. 101. E. physodes. *Linn. Sp. Pl. ed: 2. p. 506.*

$\beta$ : Corolla 4-linearis; tubo ovato.

E. physodes. *Andr. Er.* n. 44. *cum Ic.* E. physodes. *Curt. Bot. Mag.* n. 443. *cum Ic.*

Semina immatura tuberculata, postea tuberculis depresso evidenter scrobiculata.

E. foliorum laminis ovato-cuneatis: corollâ 4—5-linearis, *Blenna*. viscidâ; tubo urceolari; laciinis basi imbricatis: filamentis latissimis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.  
Pulchra species, corollis luteis ore viridi.

E. foliis 4-nis: spicis coarctatis: corollâ  $2\frac{1}{2}$ -linearis, lævi; tubo amphoræformi; limbo crenulato. *Verecunda.*

E. cernua. *Andr. Er.* n. 48. *cum Ic.*

Flores pallide carnei.

E. corollâ 2-linearis, glabra; tubo urceolari, parum 4-gono: calcaribus cuneatis, hirsutis: antheris hirsutis. *Pulchella.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.  
Facies aliqua *Galiflora*, sed veram ejus affinitatem adhuc nescio.

E. foliorum laminis linearis-lanceolatis: spicis coarctatis: corollâ 4-linearis; tubo superne admodum ventricoso: antheris exsertis. *Embothriifolia,*

Communicavit *Hibbert*.

Nomen aptius e singulari figurâ corollæ forsan exco-  
gitandum: specimen siccum tantum vidi.

*Glutinosa*, E. foliis sparsis: spicis coarctatis: corollâ 3—5-linearî,  
viscidâ; tubo ovato-pyramidalî: calcaribus auricula-  
ribus.

Variat  $\alpha$ : Corolla 3-linearis.

E. glutinosa. *Pl. Kew. t. 17.* optima. Cha-  
mæcistus roris solis foliis. *Pet. Mus. p. 22.*  
*t. 161.*

$\beta$ : Corolla 5-linearis.

E. Droseroides. *Andr. Er. n. 30.* cum *Ic.*  
E. glutinosa. *Thunb. Diff. n. 48.* Andro-  
meda droseroides. *Linn. Mant. p. 239.*  
E. glutinosa. *Berg. Pl. Cap. p. 98.* auctori-  
tate ejus speciminis.

Hujuscē generis est proculdubio, nec, quicquid suadeat  
Habitus, ad *Andromedam* referenda.

*Curvifolia*. E. foliis ternis: laminis recurvis: spicis coarctatis:  
corollâ 4-linearî, viscidâ; tubo ovato-pyramidalî:  
calcaribus linearî-attenuatis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.  
Pericarpium minutissime hirtum.

*Squarrofa*, E. corollâ 5—6-linearî, viscidâ: tubo ovato-pyramidalî;  
limbo obtuso: calcaribus marginalibus: antheris læ-  
vibus.

Sponte

Sponte nascentem in *Lange Kloof*, legit F. Masson.  
Folia densissima.

E. corollâ 8—11-lineari, viscidâ; tubo ovato-pyramidalii; limbo acuto: filamentis muticis: antheris lanatis. *Gorteriæ-folia,*

Variat  $\alpha$ : Corolla 8—9-linearis.

In hac Tubus pene totus albus.

$\beta$ : Corolla 10—11-linearis.

E. retorta. *Curt. Bot. Mag. n. 362. cum Ic.*

E. retorta. *Andr. Er. n. 15. cum Ic.*

E. retorta. *Thunb. Diff. n. 91. E. retorta.*

*Linn. Suppl. p. 220. E. retorta. Montin. in Act. Holm. 1774. p. 297. t. 7.*

Herba simpliciter recurva: diversissimam directionem exprimit nomen auctorum, quam in Ordine Naturali *Graminum* aliquando videas.

E. foliorum laminis lancicolato-cuneatis: corollâ 8—10-lineari, viscidâ; tubo ampullæformi; limbo obtuso. *Ampulla-formis,*

E. ampullacea. *Andr. Er. n. 34. cum Ic.* E. ampullacea. *Curt. Bot. Mag. n. 303. cum Ic.* bonâ.

In hac cohorte, Antheræ apicibus incurvis et valde attenuatis consimiles, fere dabunt characterem.

E. foliorum laminis ovato-cuneatis: corollâ 9—11-lineari, viscidâ; tubo late ampullæformi; limbo retuso. *Capax,*

E. prægnans. *Soland. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

*E. foliis*

*Lagenæ-formis,*

E. foliis 3-nis: corollâ 12—14-lineari, viscidâ; tubo ovato apice ventricoso; limbo tubo 4-plo breviore, ovato.

E. jasminiflora! *Andr. Er.* n. 49. *cum Ic.* mediocri.

Sponte nascentem in *Platte Kloof*, locis humidis, legit F. Masson.

*Jasminiflora.* E. foliis 3-nis: corollâ 16—19-lineari, viscidâ; tubo cylindraceo apicc ventricoso; limbo tubo 3-plo breviore, ovali.

E. Aiton. *Curt. Bot. Mag.* n. 429. *cum Ic.* E. Aiton. *Andr. Er.* n. 21. *cum Ic.* malâ. E. Jasminiflora. *Prodr. p. 293.*

Flos ad amissim Jasmini Grandiflori, *Linn.*

*Pavettaflora,* E. pedunculis brévissimis: corollâ 9—10-lineari; limbo intus farinoso: filamentis juxta apicem antheræ calcaratis.

E. infundibuliformis. *Roxb. MS.*

Comunicavit *Hibbert*: splendidum donum, ejus nomine, si talia admittere potuisse, certe condecorandum. Calcaria etiam in hac potius e. filamento, quam ipsâ antherâ, exseruntur.

*Fasciformis,* E. pedunculis brevissimis: corollâ 5—6-lineari; limbo intus farinoso: filamentis muticis: antheris rectis.

E. fastigiata. *Thunb. Diff.* n. 37. E. fastigiata. *Linn.*

*Diff.* n. 44. *cum fig. floris.* E. fastigiata. *Linn. Mant. p. 66.*

Sponte nascente in *Platte Kloof*, legit F. Masson.

E. calyce minute ciliato: corollâ 5—6-lineari; tubo *Fistulæflora*, anguste cylindraceo-urceolari; limbo brevissimo; filamentis muticis.

E. cylindrica. *Thunb. Diff. n. 39.*

Pericarpium obovatum, glabrum.

E. caule glabro: corollâ 3-lineari; tubo anguste pyramidalis basi planâ: calcaribus semilanceolatis: pericarpio obpyramidalis. *Fragrans,*

E. Muscari. *Andr. Er. n. 1. cum Ic. mediocri.*

Sponte nascentem juxta torrentem in *Zout Rivier*, legit

F. Masson.

E. caule pubescente: corollâ  $2\frac{1}{2}$ -lineari; tubo ovato-pyramidalis: calcaribus auricularibus: pericarpio sphærico. *Galiiflora,*

Variat  $\alpha$ : Corolla albida.

E. transparens. *Berg. Pl. Cap. p. 108.*

$\beta$ : Corolla rubra.

E. comosa. *Pl. Kew. t. 18. mala.* E. comosa.

*Thunb. Diff. n. 38.* E. comosa. *Linn. Diff. n. 48. cum fig. floris.* E. comosa. *Linn. Mant. p. 234.*

Vox comosus, prout usurpatur apud Botanicos, in hanc speciem minime quadrat.

E. caule pubescente: calyce obtuse, ferrato: corollâ 3-lineari; limbo tubo  $\frac{1}{2}$ -breviore: calcaribus minutissimis, auricularibus. *Nidiflora,*

E. denticulata. *Roxb. MS.*

In hortis quoque confunditur cum sequente, cui similis: vix tamen pro varietate habenda, ob filamenta calcarata, et foramina antherarum breviora.

*Denticularis*, E. caule pubescente: calyce obtuse cuneato, ferrato: corollâ 3-lineari; limbo tubo  $\frac{1}{2}$ -breviore: antheris longe foraminosis.

E. dentata. *Thunb. Diff. n. 39.* E. denticularis. *Linn. Mant. p. 22.* auctoritate speciminis ex Herbario Bergiano.

Flores purpurei.

*Pulchra*, E. caule glabro: calyce anguste lanceolato, ferrato: corollâ 4—5-lineari; limbo tubo duplo breviore: antheris breviter foraminosis.

E. Walkeria. *Andr. Er. n. 45. cum Ic. bonâ.*

*Daphniflora*, E. calyce ovato-cuspidato, vix ferrato: corollâ 3-lineari; limbo tubo duplo breviore, recurvo-deflexo: filamentis muticis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

*Pellucida*. E. caule gracili: calyce spatulato, ferrato: corollâ 5—6-lineari; limbo tubo triplo breviore; filamentis muticis.

E. pellucida. *Soland. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, solo humido, legit F. Masson.

Caulis fastigiatus, verticillis foliorum, in ramis vegetioribus, remotis. Foliorum Laminæ angustæ, linearienter attenuatæ.

attenuatæ. Corolla albida cum rubore aliquo, ita pellucida, ut literas tubo explanato subjectas facile distinguis.

E. bracteis duabus: corollâ 5—6-lineari; tubo ovato-pyramidalis; limbo brevissimo: calcaribus longissimis, subulatis. *Amabilis.*

E. inflata. *Thunb. Diff. n. 67. cum Ic.*

Species apud nos adhuc rarissima.

E. bracteis duabus: corollâ 6—7-lineari; tubo ovato-pyramidalis apice ventricosulo: calcaribus brevissimis, auricularibus. *Venusta.*

E. ventricosa. *Wendl. Er. fasc. 3. p. 11. cum Ic. malâ.*

E. ventricosa. *Curt. Bot. Mag. n. 350. cum Ic.*

E. ventricosa. *Andr. Er. n. 2. cum Ic.* E. ventricosa.

*Thunb. Diff. n. 36. cum Ic.*

Sponte naſcentem juxta *Fransche Hoek*, legit F. Masson.

E. foliis 2-nis: calyce  $1\frac{1}{2}$ -lineari, anguste ovato-cuneato: corollâ  $2\frac{1}{2}$ -lineari; tubo ovato-pyramidalis: pericarpio obovato. *Imbellis,*

Variat  $\alpha$ : Corolla albida.

$\beta$ : Corolla pallide lutea.

$\gamma$ : Corolla lutea.

E. lutea. *Wendl. Er. fasc. 1. p. 13. cum Ic.*

E. lutea. *Andr. Er. n. 11. cum Ic.* E. lutea. *Thunb. Diff. n. 49.* E. lutea. *Linn. Diff. n. 2. cum fig. floris.* E. lutea. *Linn. Mant. p. 234.* E. lutea. *Berg. Pl. Cap. p. 115.*

Corollæ Lacinie æquales sunt: inæquales, ut describit Willdenow, in toto genere haud ferme invenias.

*Linifolia*, E. foliis 2-nis: calyce  $1\frac{1}{2}$ -lineari, late ovali-acuminulato: corollâ 2-lineari; tubo ovato: pericarpio turbinato.

Variat  $\alpha$ : Corolla pallidissime rubra.

E. foliis lanceolatis oppositis imbricatis, &c.

*Linn. Hort. Cliff. p. 148.*

$\beta$ : Corolla lâete rubra.

E. tenuifolia. *Linn. Diff. n. 33. cum fig. floris.*

E. tenuifolia. *Berg. Pl. Cap. p. 116.* E. tenuifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 507.* E. africana, altera, &c. *Seb. Thes. v. I. p. 157. t. 73. f. 6.*

Filamenta, æque ac in Imbelli, calcarata.

*Borboniacæ-folia*. E. foliis 2-nis: calyce  $3\frac{1}{2}$ -lineari, late ovali-acuminulato: corollâ  $3\frac{1}{2}$ -lineari; tubo ovato: pericarpio obovato.

Communicavit *Hibbert*.

Hasce tres, foliis 2-nis, puras legitimasque esse species, minime pro certo affirmarem: calycis enim proportio, in quibusdam aliis admodum variabilis.

*Corifolia*, E. calyce reclinato-patente: corollâ  $1\frac{1}{2}$ -lineari, calyci plus minus æquali; tubo urceolari; laciniis acutis.

E. articularis. *Curt. Bot. Mag. n. 423. cum Ic.* E. callycina. *Andr. Er. n. 17. cum Ic.* E. corifolia. *Thunb. Diff. n. 77.* E. corifolia. *Linn. Diff. n. 26. cum fig. floris tenelli*, pessimâ. E. articularis. *Linn. Mant. p. 65.* An sit Corifolia *Sp. Pl. cd. 2.* solum ab Herbario Burmanniano discendum.

*Obvallaris*, E. bracteis grandibus, obovatis, supra medium pedunculi: corollâ 2-lineari; laciniis totis crenulatis.

E. bracteata.

*E. bracteata.* *Thunb. Diff. n. 3.*

Sponte nascente in ad *Platte Kloof* montibus, legit C. P. Thunberg.

Filamenta certe calcarata.

*E. foliorum* laminis pube densâ ciliatis : corollâ 2-lineari, *Hyssopifolia*, versus apicem hirtâ ; laciniis crispis, retusis.

*E. pigra.* *Soland. MS.*

Sponte nascentem juxta *Baay Fals*, legit G. Robertson.

Bracteæ tantummodo duæ, ut in omnibus hujus cohortis : vicem tertiae supplet folium pedunculo subiectum, dilatum, et plerumque coloratum.

*E. foliorum* laminis reclinatis, acute mucronatis : corollâ 3-lineari ; laciniis ovato-cuncatis, 2-fidulis. *Taxifolia*.

*E. taxifolia.* *Wendl. Er. fasc. 2. p. 19. cum Ic.* *E. taxifolia.* *Pl. Kew. t. 19.*

Calcaria in hac recte delineavit *Wendland* : hinc ab alio auctore ejus differentiam specificam, quæ antheras muticas sistit, concinnatam fuisse suspicor.

*E. floribus* in rudimentis axillaribus : calyce cuspidato, *Pugionifolia*, longe ciliato : corollâ 4-lineari, pyramidali : antheris a medio foraminosis.

*E. tetragona.* *Thunb. Diff. n. 5. cum Ic.*

Flores lutei.

*E. floribus* in rudimentis axillaribus : calyce acuminato : *Viminalis*. corollâ 3-lineari, ovatâ : antheris juxta apicem foraminosis.

E. albens. *Curt. Bot. Mag.* n. 440. *cum Ic.* E. albens.  
*Linn. Diff.* n. 34. *cum fig. floris.* E. albens. *Linn.*  
*Mant.* p. 231.

Flores ochroleuci.

Paucula nunc in vacuo chartæ spatiolo, de nostris nominibus, inserere liceat. Satis scio, his temporibus periculum quid novandi: etiam doctissimos Botanicos, qui nullum, quantumvis licet absurdum vocabulum, quod ipsi non antea irrisui damnaverint, mutari patiuntur. Tantis viris, me nil contra rationem unquam mutasse, modo respondeam: quibus autem hortulanorum gentis prudentissimæ nomina adulatoria magis placeant, omnibus istis religiose a me citatis, prout cuique libido est, utantur.